

MoviGo® Duo

Solution buvable prête à boire en sachet

DISPOSITIF MÉDICAL

Pour le traitement et le soulagement efficace et doux de la constipation, lorsqu'elle est associée à des gaz et des ballonnements.

1. Quel est ce produit et dans quel cas est-il utilisé ?

MoviGo Duo est un dispositif médical conçu pour aider à soulager la constipation ou les selles dures à évacuer, lorsqu'elles sont associées à des gaz et des ballonnements.

MoviGo Duo contient du macrogol 4000 pour traiter la constipation et de la siméticone pour aider à soulager les ballonnements.

Le macrogol 4000 ramollit les selles en attirant de l'eau dans l'intestin. Il aide ainsi à hydrater les selles et les rend plus faciles à évacuer, rendant le transit plus confortable et régulier, généralement sans causer un besoin soudain ou urgent de se rendre aux toilettes. Le macrogol 4000 n'est pas absorbé par l'organisme. Il parcourt le système digestif et est évacué avec les selles sans effort.

La siméticone dissout les bulles de gaz emprisonnées afin d'éliminer les gaz gastro-intestinaux liés à la constipation.

1.1 Composition

Chaque sachet contient :

10 g de macrogol 4000, 100 mg de siméticone

Excipients : eau, sucralose, arômes orange, glycérine végétale, polysorbate 80, esters de saccharose, sorbate de potassium.

2. Posologie et durée du traitement

La dose recommandée est :

- enfants de 1 an à 6 ans : 1 sachet par jour.
- adultes et enfants à partir de 6 ans : 2 sachets par jour.

Buvez le produit directement dans le sachet ou diluez avec de l'eau si nécessaire. Il est conseillé de prendre le produit entre les repas.

Pour les patients atteints d'insuffisance rénale, il n'est pas nécessaire d'ajuster la posologie.

La durée du traitement est généralement de 2 semaines. Cependant, un traitement répété ou prolongé peut être nécessaire en cas de constipation réfractaire ou chronique. Une telle constipation peut être causée par des médicaments tels que des analgésiques (opioïdes), ou des médicaments pour le traitement de la maladie de Parkinson (anticholinergiques). Des maladies telles que la sclérose en

plaques ou la maladie de Parkinson peuvent provoquer une constipation réfractaire.

Dans tous les cas, n'utilisez pas ce produit pendant plus de 30 jours consécutifs sans consulter votre médecin.

3. Contre-indications

Ne pas ingérer ce produit en cas d'intolérance au produit ou d'hypersensibilité connue à l'un des composants ou au polyéthylène glycol.

Ne pas utiliser le produit chez les enfants de moins d'1 an.

N'ingérez pas ce produit si vous êtes atteint(e) de :

- sténose intestinale
- perforation intestinale
- maladie inflammatoire de l'intestin (par exemple maladie de Crohn, rectocolite hémorragique).

Ne pas prendre ce médicament en cas d'obstruction intestinale.

4. Grossesse et allaitement

Aucune donnée n'est disponible concernant l'utilisation de ce produit pendant la grossesse ou l'allaitement. Si vous êtes enceinte, si vous planifiez une grossesse ou si vous allaitez, demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin avant de prendre ce produit.

5. Effets indésirables éventuels

Il est recommandé de ne pas dépasser la posologie suggérée, car des doses plus élevées peuvent provoquer des effets indésirables imprévus.

Des troubles gastro-intestinaux, comme des borborygmes, des douleurs abdominales, des nausées et une diarrhée légère (en particulier en début de traitement) peuvent se développer. Si les effets indésirables s'aggravent ou ne disparaissent pas en quelques jours, ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, informez votre médecin.

De rares réactions d'hypersensibilité (éruption cutanée et urticaire) peuvent survenir. Si vous ressentez ces effets indésirables, arrêtez de prendre ce produit et consultez immédiatement votre médecin.

6. Interactions avec les compléments alimentaires et les médicaments

Ce produit pourrait modifier la biodisponibilité d'autres médicaments s'ils sont pris en même temps. En particulier, le pouvoir osmotique du macrogol et la modification du transit gastro-intestinal peuvent affecter négativement leur efficacité.

Il convient donc de retarder la prise du produit d'au moins 2 heures après l'administration de médicaments pris par voie orale ou de tout autre produit ou complément alimentaire. Consultez votre médecin avant de prendre ce produit si vous prenez actuellement d'autres traitements.

7. Conservation

Conserver ce produit dans un endroit sec, entre 15 °C et 25 °C, et à l'abri de sources directes de chaleur ou de lumière. Ouvrir le sachet seulement au moment de l'utilisation. Ne pas utiliser si le sachet est endommagé. Tenir hors de portée des enfants.

8. Avertissements et précautions

Pour rester en bonne santé, et notamment garder un intestin sain, il est recommandé de suivre un régime alimentaire approprié et de boire suffisamment de liquides (généralement de 2,0 à 2,5 litres par jour).

Avant d'utiliser ce produit chez les enfants, il est conseillé de consulter un médecin.

La siméticone peut interférer avec l'effet de certains réactifs utilisés dans les diagnostics, tels que la gomme gaïac.

9. Date de péremption

Ne pas prendre après la date de péremption imprimée sur l'emballage. La date de péremption s'applique au produit conservé dans son contenant intact.

10. Élimination


Les produits périmés seront éliminés conformément aux réglementations de gestion des déchets de votre pays. Veuillez ne pas jeter ce produit sur la voie publique et éliminer le conditionnement de ce produit de manière responsable.

MoviGo Duo, Norgine et le logo avec la voile sont des marques du groupe de sociétés Norgine.



Norgine SAS
23 rue François Jacob
92500 Rueil-Malmaison, France

Norgine NV
Philipssite 5 bus 1
3001 Heverlee, Belgique



Norgine logo



SIIT srl

Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italie