

BIOCIDAN

0,25 POUR MILLE, collyre
Bromure de céthexonium

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, collyre et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, collyre ?
3. Comment utiliser BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, collyre ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, collyre ?
6. Informations supplémentaires.

1

QU'EST-CE QUE BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, COLLYRE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un collyre (gouttes oculaires) contenant un antiseptique.

- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre au minimum 15 minutes entre chaque instillation.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

2

QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, COLLYRE ?

N'utilisez jamais BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, collyre dans les cas suivants :

- Allergie à certains antiseptiques (ammoniums quaternaires).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

N'utilisez jamais Biocidan 0,25 pour mille, collyre:

Mises en garde spéciales

- En cas d'apparition de symptômes anormaux (rougeur et/ou douleur de l'œil), consulter votre médecin.

Précautions d'emploi

- L'utilisation de ce collyre doit être évitée chez les porteurs de lentilles de contact chez qui le risque d'intolérance locale est majoré.
- Respecter la posologie préconisée et ne pas prolonger le traitement au-delà de 15 jours.
- Ne pas toucher l'œil avec l'extrémité du flacon.
- Refermer celui-ci soigneusement après usage.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ne pas associer deux antiseptiques.

En cas de traitement concomitant par un collyre contenant un principe actif différent ; espacer de 15 minutes les instillations.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Immédiatement après utilisation, il se peut que votre vision soit troublée. Faites attention si vous conduisez des véhicules ou si vous utilisez des machines.



23112703

3**COMMENT UTILISER BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, COLLYRE ?****Posologie/mode d'administration**

Voie ophtalmique

Instiller 1 goutte dans l'œil 3 à 4 fois par jour pendant 7 jours.

Ne pas toucher l'œil avec l'extrémité du flacon.

Utilisation du flacon compte-gouttes :

- Visser à fond le capuchon perforateur afin de percer l'embout du flacon.
- Pour utiliser le collyre, dévisser le capuchon et instiller les gouttes en pressant légèrement le flacon entre le pouce et l'index.
- Instiller le collyre dans l'œil ou les yeux malade(s) en regardant vers le haut et en tirant la paupière inférieure vers le bas.
- Après usage, revisser le capuchon pour assurer la fermeture du flacon et remettre le flacon dans sa boîte.



DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Durée du traitement

Ne pas prolonger le traitement au delà de 15 jours.

Si vous avez utilisé plus de BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, collyre que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile.

4**QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet : irritation locale.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance – Site internet : www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5**COMMENT CONSERVER BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, COLLYRE ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, collyre après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Ce médicament ne doit pas être conservé plus de 28 jours après ouverture du flacon.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6**INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

Que contient BIOCIDAN 0,25 POUR MILLE, collyre ?

La substance active est :Bromure de céthexonium 0,025 g
Pour 100 ml de solution.**Les autres composants sont :**

Chlorure de sodium, eau pour préparations injectables.

Qu'est-ce que BIOCIDAN 0,25 pour mille, collyre et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de collyre en solution.

Boîte de 1 flacon compte-gouttes.

Titulaire

MENARINI FRANCE
1/7 RUE DU JURA
SILIC 528
94633 RUNGIS CEDEX

Exploitant

MENARINI FRANCE
1/7 RUE DU JURA
SILIC 528
94633 RUNGIS CEDEX

Fabricant

EXCELVISION
RUE DE LA LOMBARDIERE
ZI DE LA LOMBARDIERE
07100 ANNONAY

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 28 octobre 2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France) www.ansm.fr.

MENARINI cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine.



MENARINI participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. MENARINI vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.



23112703