

POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade

Acide salicylique

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade ?
3. COMMENT UTILISER POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE POMMADE M.O. COCHON 50 %, POMMADE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

KERATOLYTIQUE

(Dermatologie)

Ce médicament est préconisé dans le traitement local d'appoint des cors, durillons, œil-de-perdrix et verrues.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER POMMADE M.O. COCHON 50 %, POMMADE ?

N'utilisez jamais POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade dans les cas suivants :

- allergie à un des composants du produit,
- cors infectés.

Faites attention avec POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade :

Mises en garde spéciales

En cas d'artérite, de diabète ou de neuropathie, consulter votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

Ce produit est caustique. Ne pas déborder en dehors de la zone à traiter.

Arrêter l'application en cas de survenue de douleurs.

Ce produit ne doit pas être appliqué sur une grande surface.

Précautions d'emploi

En cas d'échec du traitement bien conduit ou en cas de récurrence, consulter votre médecin. Il peut être utile de rechercher la cause et de la traiter en conséquence (mesures orthopédiques de correction de l'appui, modification du chaussage).

Ne pas utiliser sur les muqueuses.

Ne pas déborder sur la peau saine.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

3. COMMENT UTILISER POMMADE M.O. COCHON 50 %, POMMADE ?

Posologie

Chaque soir, après un bain chaud, enduire avec soin la lésion sans déborder sur la peau saine.

Couvrir d'un pansement la nuit.

En cas de verrue, un traitement plus prolongé peut être nécessaire

Mode et voie d'administration

Voie cutanée

Si vous avez utilisé plus de POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade que vous n'auriez dû :

- risque de brûlure en cas de surdosage.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- irritation de la peau en cas d'application sur la peau saine,
- risque de phénomène d'irritation local et de sensation de brûlure.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet: www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER POMMADE M.O. COCHON 50 %, POMMADE ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade ?

La substance active est :

Acide salicylique 50 g
Pour 100 g de pommade.

L'autre composant est :

Suif de bœuf.

Qu'est ce que POMMADE M.O. COCHON 50 %, pommade et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de pommade.

Pot de 10 g.

Titulaire

Laboratoire TRADIPHAR
176, RUE DE L'ARBRISSEAU
59000 LILLE

Exploitant

Laboratoire TRADIPHAR
176, RUE DE L'ARBRISSEAU
59000 LILLE

Fabricant

Laboratoire TRADIPHAR
176, RUE DE L'ARBRISSEAU
59000 LILLE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 06/05/2014.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).