

HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon

Hexetidine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon?
3. COMMENT UTILISER HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ?

ANTISEPTIQUE.

Ce médicament est indiqué dans le traitement local d'appoint des affections de la bouche.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER HEXTRIL 0,1 POUR CENT, BAIN DE BOUCHE, FLACON?

N'utilisez jamais HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon dans les cas suivants:

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'héxétidine ou à l'un des autres composants contenus dans HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon.
- Chez les enfants de moins de 6 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon :

Mises en garde spéciales:

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques dans la formule qui peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées ([voir Comment utiliser HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon](#)).

Ce médicament contient de petites quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par dose.

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (azorubine E122) et peut provoquer des réactions allergiques.

Précautions d'emploi

Ne pas dépasser 10 jours de traitement: au-delà consultez votre médecin.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et Allaitement

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.

D'une façon générale il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Liste des excipients à effet notoire : colorant azoïque (azorubine E122), éthanol.

3. COMMENT UTILISER HEXTRIL 0,1 POUR CENT, BAIN DE BOUCHE, FLACON?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

Mode d'administration

Utilisation locale en bains de bouche.

NE PAS AVALER.

Fréquence d'administration

Cette solution pour bain de bouche s'emploie pure ou diluée : 1 dose 2 à 3 fois par jour.

Pur : verser HEXTRIL dans le gobelet doseur jusqu'à l'encoche indiquant 15 ml.

Dilué : en cas d'apparition de manifestations douloureuses. Utiliser la solution diluée au ½ :

Verser HEXTRIL dans le gobelet doseur jusqu'à l'encoche indiquant 15 ml. Compléter ensuite avec de l'eau jusqu'en haut du gobelet.

Bien rincer le gobelet doseur après chaque utilisation.

Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 10 jours.

Si vous avez utilisé plus de HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon que vous n'auriez dû :

Un surdosage n'est pas attendu dans les conditions normales d'utilisation. Certains constituants de ce médicament (huiles essentielles) peuvent entraîner à doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsions chez l'enfant.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, demandez conseil à votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet : Des cas de réactions de type allergiques de la peau et des muqueuses, le plus souvent à type de gonflement du visage, du cou, inflammation de la bouche ont été rapportés. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER HEXTRIL 0,1 POUR CENT, BAIN DE BOUCHE, FLACON?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon après la date de péremption mentionnée sur l'emballage.

A conserver à une température ne dépassant pas + 25° C et conserver le conditionnement primaire dans l'emballage extérieur.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon ?

La substance active est :

Hexetidine 0,1000 g

Pour un flacon de 100 ml

Les autres composants sont :

Polysorbate 60, saccharine sodique, salicylate de méthyle, huile essentielle de girofle, menthol, huile essentielle d'anis, huile essentielle de menthe poivrée, huile essentielle d'eucalyptus, azorubine 85 % (E 122), acide citrique monohydraté, éthanol à 96 pour cent, eau purifiée.

Qu'est-ce que HEXTRIL 0,1 POUR CENT, bain de bouche et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de bain de bouche. Boîte de un flacon de 30, 100, 200 ou 400 ml.

Titulaire

MCNEIL SANTE GRAND PUBLIC
1 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Exploitant

MCNEIL SANTE GRAND PUBLIC
1 RUE CAMILLE DESMOULINS
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Fabricant

famar orleans
5, avenue de Concyr
45071 ORLEANS

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 21/02/2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).