

# DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt

Chlorhexidine/Tétracaine

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent au-delà de 5 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt ?
3. COMMENT PRENDRE DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE DRILL SANS SUCRE, PASTILLE ÉDULCORÉE À L'ASPARTAM ET À L'ISOMALT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTISEPTIQUE LOCAL/ANESTHESIQUE LOCAL.

(R02A: préparation pour la gorge).

Ce médicament est préconisé en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphtes et de petites plaies de la bouche.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DRILL SANS SUCRE, PASTILLE ÉDULCORÉE À L'ASPARTAM ET À L'ISOMALT ?

**Ne prenez jamais DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt** dans les cas suivants:

- chez l'enfant de moins de 6 ans.
- si vous êtes allergique aux anesthésiques locaux et à la chlorhexidine ou aux autres composants de la pastille à sucer.
- En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Faites attention avec DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt:**

### Mises en garde spéciales

L'anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d'un repas avec impression "d'avaler de travers") lors de la déglutition des aliments.

Il est donc impératif:

- de n'utiliser ce médicament qu'avec précaution chez l'enfant de moins de 12 ans,
- de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.

L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.

Respecter la posologie indiquée: pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament en passant dans la circulation sanguine, est susceptible de retentir sur le système nerveux avec possibilité de convulsions et sur le cœur.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

### Précautions d'emploi

L'apport calorique est de 8 kcal/pastille.

#### Mal de gorge

En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachat) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours: CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

#### Aphtes, petites plaies de la bouche

En cas de lésions étendues, d'extensions des lésions, d'apparition de fièvre: CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

Respectez la posologie indiquée: pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament en passant dans la circulation sanguine est susceptible de retentir sur le système nerveux avec la possibilité de convulsions et sur le cœur.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

N'utilisez pas en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Aliments et boissons

Les pastilles ne doivent pas être prises avant les repas ou avant la prise de boisson.

### Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est à éviter en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Sportifs

L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (la tétracaine) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

Liste des excipients à effet notoire: aspartam (E 951).

## 3. COMMENT PRENDRE DRILL SANS SUCRE, PASTILLE ÉDULCORÉE À L'ASPARTAM ET À L'ISOMALT ?

### Posologie

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

#### Adulte:

1 pastille à sucer 4 fois par 24 heures.

#### Enfant de 6 à 15 ans:

1 pastille à sucer 2 à 3 fois par 24 heures.

### Mode et voie d'administration

Voie buccale.

Sucer lentement les pastilles sans les croquer et à distance des repas.

### Fréquence d'administration

Les prises doivent être espacées au moins de 2 heures.

### Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

En cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus de DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt que vous n'auriez dû:**

En cas de surdosage accidentel, **ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ, RAPIDEMENT VOTRE MEDECIN.**

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- Eruptions cutanées: dans ce cas, arrêtez le traitement,
- Possibilité d'engourdissement passager de la langue,
- En cas de fausse route (toux au cours d'un repas avec impression "d'avaler de travers") il est conseillé d'interrompre le traitement et demander avis à un médecin.
- Une coloration brune de la langue; elle est sans danger et disparaît à l'arrêt du traitement.
- Une coloration des dents peut également survenir; elle peut être facilement prévenue par un brossage quotidien.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER DRILL SANS SUCRE, PASTILLE ÉDULCORÉE À L'ASPARTAM ET À L'ISOMALT ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ce médicament est sensible à l'humidité, conserver les plaquettes thermoformées dans l'emballage extérieur.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt ?**

**La substance active est:**

Digluconate de chlorhexidine ..... 3,000 mg

Sous forme de solution de digluconate de chlorhexidine à 20 pour cent

Chlorhydrate de tétracaine ..... 0,200 mg

Pour une pastille.

**Les autres composants sont:**

Acide ascorbique, arôme coquelicot, arôme pulmoral, glycyrrhizinate d'ammonium, lubrifiant, aspartam, isomalt.

**Qu'est-ce que DRILL SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'aspartam et à l'isomalt et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de pastille à sucer. Boîte de 12 ou 24.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Titulaire**

PIERRE FABRE MEDICAMENT  
45, PLACE ABEL GANCE  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

**Exploitant**

PIERRE FABRE MEDICAMENT  
45, PLACE ABEL GANCE  
92100 BOULOGNE

**Fabricant**

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION  
45, PLACE ABEL GANCE  
92100 BOULOGNE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 16/06/2011.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).