

## CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut-être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique ?
3. COMMENT PRENDRE CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 G SANS SUCRE, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ÉDULCORÉ À LA SACCHARINE SODIQUE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE est un médicament de la digestion.  
Ce médicament est indiqué dans le traitement des troubles dyspeptiques (lenteurs à la digestion, ballonnements).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 G SANS SUCRE, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ÉDULCORÉ À LA SACCHARINE SODIQUE ?

**Ne prenez jamais CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE:**

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE.

**Faites attention avec CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE:**

Ce médicament contient du sodium. Ce médicament 450 mg de sodium par comprimé. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Prise d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse et allaitement**

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement. D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Informations importantes concernant certains composants de CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE:**

Sodium (environ 450 mg par comprimé).

### 3. COMMENT PRENDRE CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 G SANS SUCRE, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ÉDULCORÉ À LA SACCHARINE SODIQUE ?

**Posologie**

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 15 ANS.

1 à 3 comprimés par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g, comprimé effervescent n'agit pas comme vous l'attendiez, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Mode d'administration**

Voie orale.

Prendre les comprimés avant ou après les repas.

Dissoudre les comprimés dans un demi-verre d'eau.

**Durée du traitement**

La durée du traitement est limitée à 7 jours. Au-delà, vous devez consulter votre médecin.

**Si vous avez pris plus de CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE que vous n'auriez dû:**

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE:**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

**Comme tous les médicaments, CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.**

Dans certains cas rares, une réaction allergique peut survenir. Vous pouvez identifier les signes d'allergie: par des boutons et/ou des rougeurs de la peau, ou par un brusque gonflement du visage et du cou.

Si vous ressentez un effet indésirable et que vous pensez que celui-ci est lié à ce médicament, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 G SANS SUCRE, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ÉDULCORÉ À LA SACCHARINE SODIQUE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CITRATE DE BETAINE UPSA 2 g, SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Ce médicament doit être conservé à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Reboucher le tube immédiatement après usage.

L'action de la cartouche déshydratante contenue dans le bouchon favorise la conservation des comprimés. L'absorption accidentelle de son contenu ne présente pas de danger, le produit étant dépourvu de toxicité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE ?**

**La substance active est:**

Citrate de bétaine ..... 2,000 g

Pour un comprimé effervescent.

**Les autres composants sont:**

Bicarbonate de sodium, acide citrique anhydre, mannitol, arôme citron en poudre\*, benzoate de sodium, saccharine sodique, macrogol 6000.

\*Composition de l'arôme citron en poudre: huiles essentielles d'agrumes (essentiellement citron), substances aromatisantes naturelles atomisées sur amidon modifié, acide citrique, butylhydroxyanisole.

**Qu'est-ce que CITRATE DE BETAINE CITRON UPSA 2 g SANS SUCRE et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé effervescent. Boîte de 2 tubes de 10 comprimés effervescents.

**Titulaire**

UPSA SAS

3 RUE JOSEPH MONIER

92500 RUEIL-MALMAISON

**Exploitant**

UPSA SAS  
3 RUE JOSEPH MONIER  
92500 RUEIL-MALMAISON

**Fabricant**

UPSA SAS  
979, AVENUE DES PYRENEES  
47520 LE PASSAGE

ou

UPSA SAS  
304, AVENUE DU DOCTEUR JEAN BRU  
47000 AGEN

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 09/09/2015.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

**CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE**

Si vous êtes régulièrement sujet à des troubles dyspeptiques (lenteurs à la digestion, ballonnements), il est alors recommandé:

- D'avoir une alimentation variée et équilibrée.
- D'éviter les repas trop riches en graisses et/ou trop copieux, les boissons gazeuses.
- Manger dans le calme, si possible à heures fixes.
- Boire suffisamment d'eau dans la journée.
- Eviter la pratique d'un effort important juste après les repas.
- Eviter dans la mesure du possible stress et anxiété.
- Observer une bonne hygiène de vie générale: sommeil suffisant, exercice physique.
- Eviter la vie sédentaire.
- Limiter la consommation d'alcool.
- Supprimer le tabac.

VOTRE PHARMACIEN, VOTRE MEDECIN, CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS.

N'HESITEZ PAS A LEUR DEMANDER DES PRECISIONS.

NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.