

# DRILL CITRON MENTHE, pastille

Chlorhexidine, Tétracaïne

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien
- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION destinée à être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.
- Lisez attentivement la notice, et pour toute précision, comme en cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DRILL CITRON MENTHE, pastille ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DRILL CITRON MENTHE, pastille ?
3. COMMENT PRENDRE DRILL CITRON MENTHE, pastille ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DRILL CITRON MENTHE, pastille ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE DRILL CITRON MENTHE, PASTILLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTISEPTIQUE LOCAL / ANESTHESIQUE LOCAL

(R02A: préparation pour la gorge).

Ce médicament est préconisé en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphtes et de petites plaies de la bouche.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DRILL CITRON MENTHE, PASTILLE ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais DRILL CITRON MENTHE, pastille** dans les cas suivants:

Chez l'enfant de moins de 6 ans.

Si vous êtes allergique aux anesthésiques locaux, à la chlorhexidine, ou aux autres composants de la pastille.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Faites attention avec DRILL CITRON MENTHE, pastille:**

### Mises en garde spéciales

- L'anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d'un repas avec impression « d'avaler de travers ») lors de la déglutition des aliments.  
Il est donc impératif:
  - de n'utiliser ce médicament qu'avec précaution chez l'enfant de moins de 12 ans,
  - de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.
- L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

### Précautions d'emploi

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase / isomaltase (maladies héréditaires rares).

En cas de diabète ou de régime hypoglycémique, tenir compte dans la ration journalière de la quantité de sucre par pastille: 2,5 g.

### Mal de gorge:

En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5

jours: **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.**

### Aphtes, petites plaies de la bouche:

En cas de lésions étendues, d'extension des lésions, d'apparitions de fièvre: **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.**

Respectez la posologie indiquée: pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament en passant dans la circulation sanguine, est susceptible de retentir sur le système nerveux avec possibilité de convulsions et sur le cœur.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

N'utilisez pas en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est à éviter en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Sportifs

L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors de contrôles antidopages.

Liste des excipients à effet notable: Saccharose.

## 3. COMMENT PRENDRE DRILL CITRON MENTHE, PASTILLE ?

### Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

#### Adulte:

1 pastille à sucer 4 fois par 24 heures.

#### Enfants de 6 à 15 ans:

1 pastille à sucer 2 à 3 fois par 24 heures.

### Mode et voie d'administration

Voie buccale.

Sucer lentement les pastilles sans les croquer et à distance des repas.

**Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré**

**Les prises doivent être espacées au moins de 2 heures.**

### Durée du traitement

La durée est limitée à 5 jours.

En cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, consultez votre médecin.

**Si vous avez pris plus de DRILL CITRON MENTHE, PASTILLE qu'il ne fallait:**

En cas de surdosage accidentel, **ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE MEDECIN.**

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DRILL CITRON MENTHE, pastille est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Eruptions cutanées: dans ce cas, arrêtez le traitement,
- Possibilité d'engourdissement passager de la langue,
- Une coloration brune peut apparaître sur la langue. Elle est sans danger et disparaît à l'arrêt du traitement. Une coloration des dents peut également survenir; elle peut être facilement prévenue par un brossage quotidien.
- En cas de fausses routes (toux au cours d'un repas avec impression d'"avaler de travers"): il est conseillé d'interrompre le traitement et de demander avis à un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre

pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER DRILL CITRON MENTHE, PASTILLE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser DRILL CITRON MENTHE, pastille après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient DRILL CITRON MENTHE, pastille ?**

**Les substances actives sont:**

Gluconate de chlorhexidine ..... 3,00 mg  
Chlorhydrate de tétracaïne ..... 0,20 mg

Pour une pastille.

**Les autres composants sont:**

Ascorbate de sodium, acide tartrique, glucose, saccharose, glycyrrhizinate d'ammonium, arôme citron\*, arôme menthe\*\*, jaune de quinoléine.

\**Composition de l'arôme citron:* citral, citronellal, géraniol, huile essentielle d'orange, huile essentielle de citron, huile essentielle de verveine, huile essentielle de géranium, d-limonène, linalol, alpha-pinène, bêta-pinène, terpinolène.

\*\**Composition de l'arôme menthe:* acétate d'éthyle, acétate d'hexyle, acétate d'isoamyle, acétate de benzyle, acétate de cis-hexényle, acide méthyle-2 valérique, anéthole, butyrate d'éthyle, 1-carvone, formiate d'anisyle, formiate d'éthyle, cis-hex-3-ene-1-ol, huile essentielle d'eucalyptus, huile essentielle de menthe crépue, huile essentielle de menthe poivrée, 4-hydroxy-2,5-diméthyl-3 (2H) furanone, PG, p-hydroxyphénylbutanone, bêta-ionone, menthol, 1,15-pentadécalactone, propionate d'isoamyle, propylène glycol, rose absolute, 1-(2,6,6-triméthyl-cyclohex-1-enyl)-but-2-énone, 3-hydroxy-2méthyl-4-pyrone.

**Qu'est-ce que DRILL CITRON MENTHE, pastille et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de pastille. Boîte de 24 pastilles.

**Titulaire**

PIERRE FABRE MEDICAMENT  
45, PLACE ABEL GANCE  
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

**Exploitant**

PIERRE FABRE MEDICAMENT  
45, PLACE ABEL GANCE  
92100 BOULOGNE

**Fabricant**

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION  
45, PLACE ABEL GANCE  
92100 BOULOGNE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 16/11/2011.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).