

## CORTISEDERMYL 0,5 %, crème

### **Lisez attentivement cette notice car elle contient des informations importantes.**

Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

La persistance des symptômes au delà de 3 jours, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.

### **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE CORTISEDERMYL 0,5 %, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CORTISEDERMYL 0,5 %, crème ?
3. COMMENT UTILISER CORTISEDERMYL 0,5 %, crème ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CORTISEDERMYL 0,5 %, crème ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE CORTISEDERMYL 0,5 %, CRÈME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Ce médicament contient un corticoïde.

Il est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans en cas de :

- piqûres d'orties,
- piqûres d'insectes,
- coups de soleil localisés.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CORTISEDERMYL 0,5 %, CRÈME ?**

**Ne pas utiliser pour vous (ou votre enfant) CORTISEDERMYL 0,5%, crème :**

- en cas d'allergie à l'hydrocortisone ou à l'un des composants de la crème ([voir Que contient CORTISEDERMYL 0,5 %, crème ?](#)),
- sur des plaies,
- sur une acné,
- sur une rosacée,
- sur une peau infectée, que l'origine soit bactérienne (par exemple impétigo...), virale (herpès, zona, varicelle), mycosique (due à des champignons microscopiques) ou parasitaire.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Faites attention avec CORTISEDERMYL 0,5 %, crème :**

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

En cas d'apparition de cloques après un coup de soleil, **consultez votre médecin** avant l'application du produit.

#### **Précautions d'emploi**

Ce médicament contient un corticoïde, respectez le mode d'utilisation. En effet une augmentation de la quantité appliquée et/ou du nombre d'application n'améliorerait ni l'activité, ni la rapidité d'action du produit mais pourrait provoquer des effets indésirables.

- Ne traitez pas de grandes surfaces,
- ne pas recouvrir d'un pansement fermé (pansement occlusif), car cela pourrait entraîner le passage d'une partie du principe actif dans le sang,
- n'appliquez pas d'autres produits à usage dermatologique sur la surface traitée,
- ne pas utiliser plus de 2 fois par jour,
- ne dépassez pas la durée d'utilisation recommandée (3 jours).

Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours de traitement, prenez l'avis de votre médecin.

En cas de :

- intolérance locale,
  - irritation, surinfection cutanée,
- Interrompez le traitement et consultez votre médecin.

#### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance, notamment s'il s'agit d'un traitement dermatologique.

#### **Grossesse et allaitement**

##### **Grossesse**

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

##### **Allaitement**

L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament.

Ne pas appliquer sur les seins lors de l'allaitement, en raison du risque d'ingestion du produit par le nouveau-né.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Liste des excipients à effet notoire:**graisse de laine.

### **3. COMMENT UTILISER CORTISEDERMYL 0,5 %, CRÈME ?**

#### **Posologie/Fréquence d'administration**

- Appliquer la crème 2 fois par jour, matin et soir.
- Appliquez le produit en couche mince, puis étalez-le en massant légèrement jusqu'à ce qu'il soit entièrement absorbé.
- Lavez-vous les mains après l'application.

#### **Durée de traitement**

La durée d'utilisation est limitée à 3 jours.

La persistance des symptômes au-delà de 3 jours nécessite de prendre un avis médical.

#### **Mode d'administration**

Voie cutanée.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, CORTISEDERMYL 0,5 %, crème est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- risque d'amincissement de la peau, de dilatation de petits vaisseaux sanguins, de vergetures, de poussée d'acné, de rougeurs et d'irritations autour de la bouche;
- des cas de développement exagéré du système pileux, de trouble de la coloration de la peau, d'infection secondaire en particulier en cas de traitement prolongé, sous pansement occlusif ou dans les plis, ont été rapportés;
- en raison de la présence de graisse de laine, risque d'eczéma (réaction allergique de la peau).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### **5. COMMENT CONSERVER CORTISEDERMYL 0,5 %, CRÈME ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CORTISEDERMYL 0,5 %, crème après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas +30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

**Que contient CORTISEDERMYL 0,5 %, crème ?**

**La substance active est:**

Hydrocortisone ..... 0,50 g

Pour 100 g de crème.

**Les autres composants sont:**

Alcool stéarylique, alcool cétylique, alcool isopropylique, graisse de laine, stéarate de macrogol 1000, stéarate de macrogol 4000, stéarate de macrogol 6000, eau distillée de laurier cerise

**Qu'est-ce que CORTISEDERMYL 0,5 %, crème et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de crème. Tube de 15 g.

**Titulaire**

Coopération Pharmaceutique Française  
Place Lucien-Auvert  
77020 Melun Cedex

**Exploitant**

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE  
Place Lucien-Auvert  
77020 MELUN CEDEX

**Fabricant**

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE  
Place Lucien-Auvert  
77020 MELUN CEDEX  
Ou  
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE  
RUE DE LA SAUSSAIE  
77310 SAINT-FARGEAU PONTIERRY

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 14/11/2013.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).