

## CETAVLON, crème

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Si les symptômes persistent, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
- Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CETAVLON, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CETAVLON, crème ?
3. COMMENT UTILISER CETAVLON, crème ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CETAVLON, crème ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE CETAVLON, CRÈME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### ANTISEPTIQUE

(D. Dermatologie)

Ce médicament est une crème antiseptique de faible activité. Il est indiqué dans le traitement local d'appoint des affections de la peau, infectées ou risquant de s'infecter.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CETAVLON, CRÈME ?

**N'utilisez jamais CETAVLON, crème** dans les cas suivants:

- sur l'œil ou le conduit auditif externe en cas de perforation tympanique,
- sur les muqueuses notamment génitales,
- en cas d'allergie à l'un des constituants, en particulier aux dérivés des ammoniums quaternaires et aux parabens,
- enfants ayant des antécédents de convulsions dues à la fièvre ou non (en raison de la présence de dérivés terpéniques dans la formule).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Faites attention avec CETAVLON, crème:**

#### **Mises en garde spéciales**

Ne pas utiliser sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau brûlée, une peau de prématuré ou de nourrisson en raison des risques de passage du principe actif dans la circulation générale.

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques qui peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.

Respectez les conseils d'utilisation:

- ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée ([voir Posologie](#)),
- ne pas appliquer sur une surface étendue du corps,
- respecter la fréquence et la durée de traitement préconisées.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé sauf avis contraire de votre médecin pendant la grossesse.

#### **Précautions d'emploi**

Dès l'ouverture du tube, une contamination microbienne est possible. Veiller à ne pas garder trop longtemps une préparation antiseptique entamée.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Avec cet antiseptique, éviter l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques différents tel que les produits iodés. L'utilisation préalable de savon doit être suivie d'un rinçage soigneux.

#### **Grossesse - Allaitement**

L'utilisation de ce médicament est déconseillé, sauf avis contraire de votre médecin pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Liste des excipients à effet notable:**Parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle.

### 3. COMMENT UTILISER CETAVLON, CRÈME ?

#### **Posologie**

Nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon, rincer abondamment à l'eau claire. Sécher. Appliquer la crème, en évitant que l'embout du tube touche directement la plaie.

Appliquer la crème sur la lésion 1 à 2 fois par jour.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE:

- Il peut ne pas être adapté à un autre cas,
- Ne pas le conseiller à une autre personne.

#### **Mode et voie d'administration**

Voie cutanée.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CETAVLON, crème est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, tels que :

- réactions allergiques locales (rougeur, irritation),
- érosions de la peau pouvant évoluer vers l'ulcère si la crème est appliquée sous un pansement fermé,
- l'utilisation sur la muqueuse rectale peut entraîner une perte de tonus du rectum.

En raison de la présence, en tant qu'excipients, de dérivés terpéniques, et en cas de non-respect des doses préconisées :

- risque de convulsion chez l'enfant et le nourrisson,
- possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr).

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### 5. COMMENT CONSERVER CETAVLON, CRÈME ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CETAVLON, crème après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient CETAVLON, crème ?**

#### **La substance active est:**

Cétrimide ..... 0,500 g

Pour 100 g de crème.

#### **Les autres composants sont:**

Alcool, alcool céstostéarylique, paraffine liquide, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, huile essentielle de lavande, eau purifiée.

**Qu'est-ce que CETAVLON, crème et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de crème, tube de 80 g.

**Titulaire**

Pierre FABRE MEDICAMENT  
45, place Abel Gance  
92654 Boulogne Cedex

**Exploitant**

PIERRE FABRE MEDICAMENT  
45, place Abel Gance  
92100 BOULOGNE

**Fabricant**

CS  
2, rue du Maréchal Foch  
45370 CLERY SAINT ANDRE  
ou  
ZENECA Limited  
Macclesfield Works  
Hurdsfield Industrial Estate  
Macclesfield  
Cheshire SK 10 2NA  
ROYAUME UNI  
ou  
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION  
45, place Abel Gance  
92100 BOULOGNE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 07/05/2015.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

**CONSEIL D'EDUCATION SANITAIRE**

**"Que faire en cas de plaie superficielle, peu étendue" :**

La gravité d'une plaie est déterminée par sa profondeur, son étendue et sa localisation.

- une plaie profonde nécessite souvent une suture, donc un recours médical dans les 6 heures environ.

- une plaie du visage, des mains ou des organes génitaux peut entraîner des marques inesthétiques ou des séquelles gênantes.

Seule une plaie superficielle et peu étendue peut être soignée sans l'avis du médecin ou du pharmacien.

?Le premier geste consiste à nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon afin d'enlever les souillures éventuelles (terre, poussières...).

?Après un rinçage abondant, appliquer l'antiseptique.

Il est indispensable de consulter rapidement un médecin voire de se rendre dans un service médical d'urgence si :

- \* la plaie est profonde ou si elle est étendue,
- \* la plaie saigne abondamment,
- \* la plaie est localisée dans une zone sensible : visage, organes génitaux, oreille...,
- \* la plaie a été provoquée par une morsure de chien ou d'un autre animal,
- \* la plaie s'accompagne d'une douleur importante et persistante,
- \* l'évolution de la plaie n'est pas satisfaisante au bout de 2 ou 3 jours,
- \* si votre vaccination antitétanique n'est pas à jour.

Toute plaie nécessite de vérifier que votre vaccination antitétanique est à jour