



NOUVEAU

ANGI-SPRAY

MAL DE GORGE
CHLORHEXIDINE / LIDOCAÏNE
collutoire



1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

DÉNOMINATION

ANGI-SPRAY MAL DE GORGE CHLORHEXIDINE / LIDOCAÏNE, collutoire

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

CHLORHYDRATE DE LIDOCAÏNE.....0,250 g
GLUCONATE DE CHLORHEXIDINE0,100 g
Pour 100 g de solution.

Excipients : Glycérol, Acésulfame de potassium, Arôme menthe*, Eau purifiée.
*Composition de l'arôme menthe : L-menthol, trans-menthone, menthol, acétate de menthyle, 4,5,6,7-tétrahydro-3,6-diméthylbenzofurane, (R)-p-mentha-1,8 diène, (S)-p-mentha-1,8 diène, l-p-mentha-1(6),8-diène-2-on, pin-2(10)-ène, pin-2(3)-ène, p-mentha-1,3-diène. Gaz propulseur : azote (pression : 7,0 bars)

FORME PHARMACEUTIQUE

Collutoire, flacon pressurisé de 40 g.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

ANTISEPTIQUE LOCAL/ANESTHÉSIQUE LOCAL (R: système respiratoire).

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

MERCK MÉDICATION FAMILIALE - 18 C BOULEVARD WINSTON CHURCHILL - F - 21000 DIJON

FABRICANT / TITULAIRE

Laboratoires Chemineau - 93, route de Monnaie 37210 Vouvray

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament contient un antiseptique local pour combattre l'infection et un anesthésique local pour soulager la douleur. Il est préconisé en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphtes et de petites plaies de la bouche.

3. ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- chez l'enfant de moins de 6 ans.
 - en cas d'antécédents d'allergie aux anesthésiques locaux et à la chlorhexidine.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

- L'anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d'un repas avec impression "d'avaler de travers") lors de la déglutition des aliments. Il est donc impératif :
 - de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson,
 - de n'utiliser ce médicament qu'avec précaution chez l'enfant de moins de 12 ans.
- L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.
- Respecter la posologie indiquée : pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament en passant dans la circulation sanguine, est susceptible de retentir sur le système nerveux avec possibilité de convulsions et sur le cœur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Cette spécialité ne doit pas être mise en contact avec les yeux, introduite dans le nez ou dans les oreilles.

- **Mal de gorge :** En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachat) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.

• **Aphtes, petites plaies de la bouche :** En cas de lésions étendues, d'extensions des lésions, d'apparition de fièvre : **CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN.**
EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

• Ne pas utiliser en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique.
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

D'une façon générale il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander un avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

SPORTIFS

L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients :

- Glycérol

4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

POSOLOGIE

Adulte : 1 pulvérisation 4 à 5 fois par jour.

Enfant de 12 à 15 ans : 1 pulvérisation 2 à 3 fois par jour.

Enfant de 6 à 12 ans : Se conformer à l'avis médical.

CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ PERSONNELLEMENT DÉLIVRÉ OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRÉCISE :

- IL NE PEUT PAS ÊTRE ADAPTÉ À UN AUTRE CAS.
- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE PERSONNE.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Pulvérisation buccale.

FRÉQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

Il est impératif de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson. Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

DURÉE DU TRAITEMENT

Le traitement ne devra pas dépasser 5 jours sans avis médical.

5. EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES

ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- éruptions cutanées : dans ce cas, arrêtez le traitement,
- possibilité d'engourdissement passager de la langue,
- en cas de fausse route (toux au cours d'un repas avec impression « d'avaler de travers ») il est conseillé d'arrêter le traitement et demander l'avis à un médecin.
- une coloration brune peut apparaître sur la langue, elle est sans danger et disparaît à l'arrêt du traitement. Une coloration des dents peut également survenir, elle peut être facilement prévenue par un brossage quotidien.

SIGNELEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

Déclaration des effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'information sur la sécurité du médicament.

6. CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

Réceptacle sous pression :

- ne pas exposer à une chaleur supérieure à 50°C, ni au soleil,
- ne pas percer,
- ne pas jeter au feu même vide.

Date de révision de la notice : 2014.

MERCK Médication Familiale
18C, Bd Winston Churchill - 21000 DIJON - FRANCE



CONSIGNÉ POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESETRI.FR

L1014650 AN1258 0001