

# ARNICAGEL, gel

Arnica

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ARNICAGEL, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ARNICAGEL, gel ?
3. COMMENT UTILISER ARNICAGEL, gel ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ARNICAGEL, gel ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE ARNICAGEL, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique des ecchymoses (bleus)

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ARNICAGEL, GEL ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé sur les muqueuses, sur les yeux, sur une plaie, une lésion suintante ou infectée.

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie connue à l'arnica ou à un autre constituant.

#### Faites attention avec ARNICAGEL, gel:

Se laver soigneusement les mains après usage afin d'éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

#### Grossesse et allaitement

##### Grossesse

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

##### Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Excipient à effet notoire:**alcoool.

### 3. COMMENT UTILISER ARNICAGEL, GEL ?

Lors de la première utilisation, percer la membrane de protection à l'aide du bouchon renversé.

A appliquer immédiatement après le traumatisme. Faire pénétrer en massant légèrement. Renouveler l'application une heure plus tard, puis 3 à 4 fois par jour jusqu'à complète disparition des symptômes

Voie cutanée.

#### Si vous oubliez de prendre ARNICAGEL, gel:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ARNICAGEL, gel est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Effets non souhaités et gênants:

Possibilité de réaction allergique nécessitant l'arrêt du traitement.

En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer des irritations et une sécheresse de la peau.

Risque de dermatose pour les personnes sensibles à l'arnica.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER ARNICAGEL, GEL ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Ne pas utiliser ARNICAGEL, gel après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conservé le tube soigneusement fermé.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### Que contient ARNICAGEL, gel ?

##### La substance active est:

Arnica (teinture d') ..... 20 g

##### Les autres composants sont:

Eau purifiée, glycérol, éthanol à 96% V/V, gomme xanthane, huile essentielle de lavande, huile essentielle de romarin.

#### Qu'est-ce que ARNICAGEL, gel et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gel en tube. Boîte de 1 tube de 25 g..

Gel en tube de 25 g.

#### Titulaire

Laboratoire WELEDA  
9, rue Eugène Jung  
BP 152  
68331 Huningue Cedex

#### Exploitant

LABORATOIRE WELEDA  
9, rue Eugène Jung  
BP 152  
68331 HUNINGUE CEDEX  
FRANCE

#### Fabricant

LABORATOIRE WELEDA  
9, rue Eugène Jung  
BP 152  
68331 HUNINGUE CEDEX

FRANCE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/10/2006.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).