LOMEXIN 2 POUR CENT, crème

Nitrate de fenticonazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE LOMEXIN 2 POUR CENT, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LOMEXIN 2 POUR CENT, crème ?
3. COMMENT UTILISER LOMEXIN 2 POUR CENT, crème ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER LOMEXIN 2 POUR CENT, crème ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE LOMEXIN 2 POUR CENT, CRÈME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

ANTIFONGIQUE LOCAL
IMIDAZOLE
(D. Dermatologie)
Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines affections cutanées ou des muqueuses (mycoses), dues à des champignons microscopiques (candidoses, dermatophyties, pityriasis versicolor).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER LOMEXIN 2 POUR CENT, CRÈME ?

N'utilisez jamais LOMEXIN 2 POUR CENT, crème dans le cas suivant:

- allergie à l'un des composants (ou sensibilité croisée avec les autres membres du groupe des imidazolés).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Faites attention avec LOMEXIN 2 POUR CENT, crème:
Mises en garde spéciales
Une utilisation prolongée peut provoquer des réactions de sensibilisation, ou de l'irritation. Si de telles réactions apparaissent, l'utilisation du produit doit être interrompue.
Précautions d'emploi
Eviter le contact avec l'œil.
Prévenez votre médecin en cas d'antécédents allergiques aux imidazolés.
Ce médicament contient de la lanoline et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple: eczéma).
Ce médicament contient de l'alcool cétylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple: eczéma).
Ce médicament contient du propylèneglycol et peut induire des irritations de la peau.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Prise ou utilisation d'autres médicaments:
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Grossesse et allaitement
Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Liste des excipients à effet notoire: propylèneglycol, lanoline, alcool cétylique.

3. COMMENT UTILISER LOMEXIN 2 POUR CENT, CRÈME ?

Posologie
Appliquer régulièrement la crème sur les lésions à traiter, une fois par jour pendant la durée recommandée par le médecin selon la mycose.
Conseils pratiques:

- Dans le cas de Candidoses, la toilette est à effectuer avec un savon à pH neutre ou alcalin.
- En gynécologie, le traitement s'accompagnera de conseils d'hygiène (port de sous-vêtements en coton, éviter les douches vaginales...) et dans la mesure du possible, de la suppression de facteurs favorisants. Ne pas interrompre le traitement pendant les règles.

Mode d'administration
Ceci est un médicament à usage local.
Durée du traitement
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, LOMEXIN 2 POUR CENT, crème est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- manifestations locales d'intolérance, démangeaison et irritation, sensation de brûlure, rougeurs,
- rarement, possibilité de passage du principe actif de ce médicament dans la circulation sanguine, en particulier lors d'applications sur une peau lésée, une surface étendue ou chez le nourrisson.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LOMEXIN 2 POUR CENT, CRÈME ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser LOMEXIN 2 POUR CENT, crème après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.
Pas de conditions de conservation particulières.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient LOMEXIN 2 POUR CENT, crème ?
La substance active est:
Nitrate de fenticonazole ..... 2,000 g
Quantité correspondant à fenticonazole base ..... 1,757 g
Pour 100 g de crème.
Les autres composants sont:
Propylèneglycol, lanoline hydrogénée, huile d'amande, esters polyglycoliques d'acides gras, alcool cétylique, monostéarate de glycérol, édétate de sodium (E 385), eau purifiée.
Qu'est-ce que LOMEXIN 2 POUR CENT, crème et contenu de l'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de crème; tube de 15 g ou 30 g.

Titulaire

EFFIK

9/11, RUE JEANNE BRACONNIER
BATIMENT « LE NEWTON »
92366 MEUDON-LA-FORET

Exploitant

EFFIK
BATIMENT « LE NEWTON »
9/11, RUE JEANNE BRACONNIER
92366 MEUDON-LA-FORET

Fabricant

EFFIK
BATIMENT « LE NEWTON »
9/11, RUE JEANNE BRACONNIER
92366 MEUDON-LA-FORET
ou
SCHERING PLOUGH
ZI - 2, RUE LOUIS PASTEUR
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 12/07/2011.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).