

GRANIONS DE ZINC 15 mg/2 ml, solution buvable en ampoule

Gluconate de zinc

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE GRANIONS DE ZINC 15 mg/2 ml, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GRANIONS DE ZINC 15 mg/2 ml, solution buvable en ampoule ?
3. COMMENT PRENDRE GRANIONS DE ZINC 15 mg/2 ml, solution buvable en ampoule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER GRANIONS DE ZINC 15 mg/2 ml, solution buvable en ampoule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE GRANIONS DE ZINC 15 MG/2 ML, SOLUTION BUVABLE EN AMPOULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament à base de zinc est préconisé dans l'acné.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GRANIONS DE ZINC 15 MG/2 ML, SOLUTION BUVABLE EN AMPOULE ?

N'utilisez jamais GRANIONS DE ZINC 15 mg/2 ml, solution buvable en ampoule:

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans la solution buvable.

Faites attention avec GRANIONS DE ZINC 15 mg/2 ml, solution buvable en ampoule:

Précautions d'emploi

Pour une meilleure absorption du produit:

- le médicament sera pris à jeun
- pendant la durée du traitement, on s'abstiendra de consommer certains aliments au repas suivant la prise du médicament (pain complet, germes de soja, grains de maïs...)
- afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.
- en particulier, n'omettez pas de signaler un traitement par antibiotiques, médicaments contenant du calcium ou du fer (qui diminueraient l'absorption du produit).

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Grossesse

Ce médicament ne doit être utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous envisagez une grossesse ou si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement, tout en l'adaptant à votre état.

Allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT PRENDRE GRANIONS DE ZINC 15 MG/2 ML, SOLUTION BUVABLE EN AMPOULE ?

- ampoules destinées à la voie orale.
- la dose journalière usuelle est de 2 ampoules prises le matin à jeun avec un verre d'eau.
- Cette posologie pourra être diminuée selon l'avis du médecin traitant après les trois premiers mois de traitement.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, GRANIONS DE ZINC 15 mg/2 ml, solution buvable en ampoule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- Au cours du traitement, il est possible que surviennent des douleurs de l'estomac et du ventre; elles sont habituellement modérées et transitoires.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER GRANIONS DE ZINC 15 MG/2 ML, SOLUTION BUVABLE EN AMPOULE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser GRANIONS DE ZINC 15 mg/2 ml, solution buvable en ampoule après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient GRANIONS DE ZINC 15 mg/2 ml, solution buvable en ampoule ?

La substance active est:

Gluconate de zinc

Quantité correspondant en zinc 15,00 mg

Pour une ampoule.

Les autres composants sont:

Amylose, glycérol, glycine, eau purifiée.

Qu'est-ce que GRANIONS DE ZINC 15 mg/2 ml, solution buvable en ampoule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable. Boîte de 30 ampoules de 2 ml.

Titulaire

LABORATOIRE DES GRANIONS
7, RUE DE L'INDUSTRIE
LE MERCATOR
98000 MONACO
MONACO

Exploitant

LABORATOIRE DES GRANIONS
7, RUE DE L'INDUSTRIE
LE MERCATOR
98000 MONACO
MONACO

Fabricant

LABORATOIRE DES GRANIONS

7, RUE DE L'INDUSTRIE
LE MERCATOR
98000 MONACO
MONACO

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 15/11/2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).