

# VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop

Citrate de pentoxyvérine

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop ?
3. COMMENT PRENDRE VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, SIROP ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament est un antitussif.

Il est indiqué dans le traitement de courte durée des toux sèches et des toux d'irritation chez l'adulte (à partir de 15 ans).

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, SIROP ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop si :**

- vous êtes allergique à l'un des constituants,
- vous êtes asthmatique,
- vous êtes insuffisant respiratoire,
- vous ressentez une gêne urinaire liée à une maladie de la prostate,
- vous avez un risque de glaucome par fermeture de l'angle.

Ce médicament NE DOIT GENELEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin pendant la grossesse.

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Faites attention avec VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop:**

### Mises en garde spéciales

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Un avis médical est indispensable dans les cas suivants:

- maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats,
- maladie du foie, épilepsie, ou grossesse en raison de la présence d'alcool.
  - Ne traitez pas par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques.
  - Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, de crachats, de fièvre, prenez l'avis de votre médecin.
  - Ce médicament contient du saccharose et du glucose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au saccharose ou au glucose (maladie héréditaire rare).
  - Ce médicament contient 10 % V/V d'éthanol (alcool), c'est-à-dire jusqu'à 1,17 g d'alcool par cuillère à soupe. L'utilisation de ce médicament est dangereuse pour les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

Attention! Ce médicament contient de l'alcool: le titre alcoolique du sirop est de 10 % soit 1,17 g d'alcool par cuillère à soupe.

### Précautions d'emploi

En cas de survenue de fièvre, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours, ne pas augmenter les doses au delà de ce qui est préconisé, ne pas prendre conjointement un autre antitussif, mais **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN**.

- N'associez pas un médicament fluidifiant des sécrétions bronchiques (expectorant, mucolytique) avec cet antitussif.
- Ce médicament contient 2,4 g de saccharose par cuillère à soupe dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucres ou de diabète.
- Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 180 mg de sodium par cuillère à soupe. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament est déconseillé en association avec les médicaments provoquant une réaction antabuse (rougeur du visage, sueurs, vomissements et palpitations) avec l'alcool (disulfirame, certains antibactériens, certains antifongiques), les dépresseurs du système nerveux central (antidépresseurs, antihistaminiques, anxiolytiques, neuroleptiques, morphiniques, certains antihypertenseurs), les médicaments destinés au traitement du diabète (chlorpropamide, glibenclamide, glipizide, insuline, metformine, sulfamides hypoglycémiant).

Ce médicament contient un antitussif, le citrate de **pentoxyvérine**. D'autres médicaments en contiennent ou contiennent un autre antitussif. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées

La consommation de boissons alcoolisées doit être évitée pendant la durée du traitement.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement

L'utilisation de ce médicament vous est déconseillée pendant la grossesse et la période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament provoque parfois une somnolence discrète et transitoire ou des vertiges risquant d'être dangereux chez les conducteurs de véhicules (automobile...) et les utilisateurs de certaines machines. Ce phénomène s'atténue après plusieurs prises. Il peut-être utile de commencer le traitement le soir.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées.

**Informations importantes concernant certains composants de VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop:** saccharose (2,4 g/15 ml), glucose, alcool (1,17 g/15 ml), sodium (180 mg/15 ml).

## 3. COMMENT PRENDRE VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, SIROP ?

### Posologie/Mode d'administration

Ce médicament est réservé à l'adulte (à partir de 15 ans)

1 cuillère à soupe de 15 ml par prise, à renouveler si nécessaire au bout de 6 heures, sans dépasser 4 prises par jour.

Chez le sujet âgé ou en cas de maladie du foie ou des reins: consultez votre médecin afin qu'il puisse adapter la posologie.

### Fréquence d'administration

Le traitement doit être limité aux horaires où survient la toux, sans dépasser les doses prescrites.

### Durée de traitement

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours

Si vous avez l'impression que l'effet de ce médicament est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous avez pris plus de VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop que vous n'auriez dû:**

En cas de surdosage accidentel, **ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT UN MEDECIN.**

**Si vous oubliez de prendre VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop:**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Possibilité de:

- réactions allergiques, notamment cutanées,
- constipation, sécheresse buccale,
- plus rarement: somnolence, gêne respiratoire, palpitations, troubles visuels, troubles urinaires, confusion ou excitation chez le sujet âgé.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, SIROP ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop ?**

**La substance active est:**

Citrate de pentoxyvérine ..... 0,150 g

Pour 100 ml.

1 cuillère à soupe (15 ml) contient 22,5 mg de citrate de pentoxyvérine.

**Les autres composants sont:**

Benzoate de sodium, chlorure de cétylepyridinium, citrate de sodium, saccharose, glucose liquide, caramel (E 150C), propylène glycol, éthanol à 96 %, huile essentielle d'anis, arôme Tingle Flavour XD 2576 (racine de gingembre, menthol, éthanol), eau purifiée.

**Qu'est-ce que VICKS SIROP PECTORAL 0,15 %, sirop et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de sirop. Flacon de 150 ml.

### **Titulaire**

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE  
163/165, Quai Aulagnier  
92600 ASNIERES SUR SEINE  
FRANCE

### **Exploitant**

PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE  
163/165, Quai Aulagnier  
92600 ASNIERES SUR SEINE  
FRANCE

### **Fabricant**

PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING GMBH  
SULZBACHER STRASSE 40-50  
658924 SCHWALBACH AM TAUNUS  
ALLEMAGNE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 23/07/2008.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).