

# STRUCTUM 500 mg, gélule

Chondroïtine sulfate sodique

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STRUCTUM 500 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STRUCTUM 500 mg, gélule ?
3. COMMENT PRENDRE STRUCTUM 500 mg, gélule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STRUCTUM 500 mg, gélule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE STRUCTUM 500 MG, GÉLULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du sulfate de chondroïtine. STRUCTUM est un anti-arthrosique. L'arthrose est une maladie causée par l'usure du cartilage. STRUCTUM est utilisé chez l'adulte (plus de 15 ans) dans le traitement de la douleur et de la gêne fonctionnelle au cours de l'arthrose du genou et de la hanche. Ce médicament a une action lente, retardée d'environ 2 mois et son effet peut persister après l'arrêt du traitement.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STRUCTUM 500 MG, GÉLULE ?

N'utilisez jamais STRUCTUM:

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la chondroïtine) ou à l'un des composants contenus dans ce médicament. Vous trouverez la [liste des composants à la rubrique 6](#).
- Chez un enfant de moins de 15 ans.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

### Grossesse et Allaitement

L'utilisation de ce médicament est déconseillée, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## 3. COMMENT PRENDRE STRUCTUM 500 MG, GÉLULE ?

Réservé à l'adulte (plus de 15 ans).

Voie orale.

Les gélules sont à avaler telles quelles avec un grand verre d'eau.

1 gélule à 500 mg, 2 fois par jour soit 1 g par jour.

**Si vous avez pris plus de STRUCTUM 500 mg, gélule que vous n'auriez dû:**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre STRUCTUM 500 mg, gélule:**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, STRUCTUM 500 mg, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Peuvent survenir des réactions allergiques cutanées de type rougeurs, urticaire, eczéma, éruption, associées ou non à des démangeaisons et/ou un œdème.

Dans ce cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

- Au cours du traitement, il est possible que surviennent également des troubles digestifs de type nausées, vomissements.

Dans tous ces cas, il faut en avertir votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER STRUCTUM 500 MG, GÉLULE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

N'utilisez pas STRUCTUM 500 mg, gélule, si vous constatez des signes visibles de détérioration du produit.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Que contient STRUCTUM 500 mg, gélule ?

#### La substance active est:

La Chondroïtine sulfate sodique ..... 500 mg

Pour 1 gélule.

#### Les autres composants sont:

Le talc.

Composition de l'enveloppe de la gélule: gélatine, dioxyde de titane, indigotine.

### Qu'est-ce que STRUCTUM 500 mg, gélule et contenu de l'emballage extérieur ?

STRUCTUM 500 mg, gélule se présente sous forme de gélule.

Boîte de 40, 60, 120 ou 180 gélules.

### Titulaire

PIERRE FABRE MEDICAMENT  
45 PLACE ABEL GANCE  
92654 BOULOGNE CEDEX

### Exploitant

PIERRE FABRE MEDICAMENT  
45 PLACE ABEL GANCE  
92654 BOULOGNE CEDEX

### Fabricant

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION  
45 PLACE ABEL GANCE  
92654 BOULOGNE CEDEX

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 31/07/2013.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).