

# CORTAPAI SYL 0,5 %, crème

Hydrocortisone

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 3 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CORTAPAI SYL 0,5 %, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CORTAPAI SYL 0,5 %, crème ?
3. COMMENT UTILISER CORTAPAI SYL 0,5 %, crème ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CORTAPAI SYL 0,5 %, crème ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE CORTAPAI SYL 0,5 %, CRÈME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament contient un corticoïde.

Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans en cas de:

- piqûres d'orties
- piqûres d'insectes
- coups de soleil localisés

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CORTAPAI SYL 0,5 %, CRÈME ?

**N'utilisez jamais CORTAPAI SYL 0,5 %, crème:**

- en cas d'allergie à l'hydrocortisone ou à l'un des composants de la formule, sur des plaies,
- sur une acné,
- sur une rosacée,
- sur une peau infectée, que l'origine soit bactérienne (par exemple impétigo...), virale (herpès, zona, varicelle), mycosique (due à des champignons microscopiques) ou parasitaire.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**Faites attention avec CORTAPAI SYL 0,5 %, crème:**

### Mises en garde

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

En cas d'apparition de cloques après un coup de soleil, **consultez votre médecin** avant l'application du produit.

### Précautions d'emploi:

Ce médicament contient un corticoïde, respectez le mode d'utilisation. En effet une augmentation de la quantité appliquée et/ou du nombre d'application n'améliorerait ni l'activité, ni la rapidité d'action du produit mais pourrait provoquer des effets indésirables.

- Ne traitez pas de grandes surfaces,
- ne pas recouvrir d'un pansement fermé (pansement occlusif), car cela pourrait entraîner le passage d'une partie du principe actif dans le sang,
- n'appliquez pas d'autres produits à usage dermatologique sur la surface traitée,
- ne pas utiliser plus de 2 fois par jour,
- ne dépassez pas la durée d'utilisation recommandée (3 jours).

Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours de traitement, **prenez l'avis de votre médecin.**

En cas de :

- intolérance locale,
- irritation, surinfection cutanée, interrompez le traitement et **consultez votre médecin.**
- Ce médicament contient de l'alcool céstéarylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).
- Il contient également du parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E219) et du parahydroxybenzoate de propyle sodé (E217) pouvant provoquer des allergies cutanées (urticaire, eczéma).

### Prise ou utilisation d'autres médicaments:

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance, notamment s'il s'agit d'un traitement dermatologique.

### Grossesse et allaitement

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.**

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse.

L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament.

Ne pas appliquer sur les seins lors de l'allaitement, en raison du risque d'ingestion du produit par le nouveau-né.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Liste des excipients à effet notable:** alcool céstéarylique, parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E 219), parahydroxybenzoate de propyle sodique (E 217).

## 3. COMMENT UTILISER CORTAPAI SYL 0,5 %, CRÈME ?

### Posologie/Mode d'administration/Fréquence d'administration

Appliquer la crème 2 fois par jour, matin et soir.

Appliquez le produit en couche mince, puis étalez-le en massant légèrement jusqu'à ce qu'il soit entièrement absorbé.

Lavez-vous les mains après l'application.

### Durée de traitement

La durée d'utilisation est limitée à 3 jours

La persistance des symptômes au-delà de 3 jours nécessite de prendre un avis médical.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CORTAPAI SYL 0,5%, crème est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- risque d'amincissement de la peau, de dilatation de petits vaisseaux sanguins, de vergetures, de poussée d'acné, de rougeurs et d'irritations autour de la bouche;
- des cas de développement exagéré du système pileux, de trouble de la coloration de la peau, d'infection secondaire en particulier en cas de traitement prolongé, sous pansement occlusif ou dans les plis, ont été rapportés,

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER CORTAPAI SYL 0,5 %, CRÈME ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CORTAPAI SYL 0,5%, crème après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Que contient CORTAPAYSYL 0,5%, crème ?

#### La substance active est:

Hydrocortisone base ..... 0,500 g  
Sous forme d'acétate d'hydrocortisone ..... 0,558 g  
Pour 100 g.

#### Les autres composants sont:

Stéarate de sorbitan, polysorbate 60, blanc de baleine synthétique, alcool céstostéarylique, octyldodécanol, parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E 219), parahydroxybenzoate de propyle sodique (E 217), imidurée, acide citrique anhydre, eau purifiée.

### Qu'est-ce que CORTAPAYSYL 0,5%, crème et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de crème. Boîte de 1 tube de 15 g ou de 3 tubes de 5 g.

#### Titulaire

MERCK MEDICATION FAMILIALE SAS  
37, rue Saint-Romain  
69379 Lyon Cedex 08

#### Exploitant

MERCK MEDICATION FAMILIALE  
18 C, boulevard Winston Churchill  
21000 DIJON  
(Siège social: 37, rue Saint Romain - 69008 LYON)

#### Fabricant

MERCK SANTE S.A.S.  
Centre de production de LACASSAGNE  
115, avenue Lacassagne  
69003 LYON  
ou  
FAMAR LYON  
29, avenue Charles de Gaulle  
69230 SAINT GENIS LAVAL

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 21/05/2015.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).