

DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé

Chlorhexidine/Tétracaïne

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé ?
3. COMMENT UTILISER DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE DRILL MAUX DE GORGE, COLLUTOIRE EN FLACON PRESSURISÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTISEPTIQUE LOCAL/ANESTHESIQUE LOCAL

- Collutoire contenant un antiseptique local et un anesthésique local.
- Ce médicament est préconisé en cas de:
 - mal de gorge peu intense, sans fièvre,
 - d'aphtes et de petites plaies de la bouche.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DRILL MAUX DE GORGE, COLLUTOIRE EN FLACON PRESSURISÉ ?

N'utilisez jamais DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé dans les cas suivants:

Chez l'enfant de moins de 12 ans.

En cas d'antécédents d'allergie aux anesthésiques locaux et aux antiseptiques.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé:

Mises en garde spéciales

- L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il est susceptible de modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche et de la gorge.
- L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.
- Cette spécialité ne doit pas être mise en contact avec les yeux, ni introduite dans le nez ou dans les oreilles.
- Ne pas utiliser en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique.
- D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.
- NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Précautions d'emploi

- Respecter la posologie (nombre de pulvérisations) indiquée; pris en quantité importante, ce médicament, en passant dans la circulation sanguine est susceptible d'agir sur le système nerveux (avec possibilité de convulsions) et sur le cœur.
- Eviter de prendre ce médicament avant les repas, l'anesthésie provoquée par ce médicament est susceptible de favoriser les fausses routes lors de la déglutition des aliments.
- Mal de gorge
En cas de survenue:
 - de fièvre
 - d'expectoration (crachats) purulente,
 - d'une gêne à la déglutition des aliments,
 - Comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.
- Aphtes, petites plaies de la bouche
En cas:
 - de lésions étendues,
 - d'extension des lésions,
 - d'apparition de fièvre.

CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est à éviter en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Ce médicament contient un anesthésique local (la tétracaïne). Cette substance peut provoquer un test positif à un contrôle antidopage.

3. COMMENT UTILISER DRILL MAUX DE GORGE, COLLUTOIRE EN FLACON PRESSURISÉ ?

- Adulte:
1 à 6 pulvérisations par jour.
- Enfants de 12 à 15 ans:
1 à 3 pulvérisations par jour.
- Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Eruptions cutanées: dans ce cas, arrêtez le traitement,
- Possibilité d'engourdissement passager de la langue,
- En cas de fausses routes (toux au cours d'un repas avec impression d'"avaler de travers"): il est conseillé d'interrompre le traitement et de demander avis à un médecin.
- Une coloration brune peut apparaître sur la langue. Elle est sans danger et disparaît à l'arrêt du traitement. Une coloration des dents peut également survenir; elle peut être facilement prévenue par un brossage quotidien.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DRILL MAUX DE GORGE, COLLUTOIRE EN FLACON PRESSURISÉ ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé ?

Les substances actives sont:

Gluconate de chlorhexidine 0,050 g
Chlorhydrate de tétracaine 0,015 g
Pour 100 ml.

Les autres composants sont:

Alcool, macrogol 300, saccharine sodique, composition aromatique 26 L 226 IIF*, acide phosphorique concentré, eau purifiée.

*Composition de la composition aromatique 26 L 226 IIF: Alcoolat de citron, vanilline, huiles essentielles de menthe poivrée et d'eucalyptus, menthol, citral.

Qu'est-ce que DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de collutoire. Flacons de 40 ou 55 ml.

Titulaire

PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, PLACE ABEL GANCE
92654 BOULOGNE CEDEX

Exploitant

PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, PLACE ABEL GANCE
92100- BOULOGNE

Fabricant

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
SITE PROGIPHARM
RUE DU LYCEE
45500 GIEN

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 08/02/2016.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).