

BEPANTHEN 5 %, crème

Dexpanthénol

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BEPANTHEN 5 %, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BEPANTHEN 5 %, crème ?
3. COMMENT UTILISER BEPANTHEN 5 %, crème ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER BEPANTHEN 5 %, crème ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE BEPANTHEN 5 %, CRÈME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

D03AX - AUTRES CICATRISANTS

(D. DERMATOLOGIE)

Traitement des irritations cutanées.

Réservé à l'adulte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BEPANTHEN 5 %, CRÈME ?

N'utilisez jamais BEPANTHEN 5 %, crème dans les cas suivants:

- Allergie à l'un des composants.
- Maladie de la peau infectée.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notable: propylèneglycol, graisse de laine.

3. COMMENT UTILISER BEPANTHEN 5 %, CRÈME ?

Posologie

Appliquer en massant légèrement une à plusieurs fois par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de BEPANTHEN 5 %, crème est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie cutanée.

Si vous avez utilisé plus de BEPANTHEN 5 %, crème que vous n'auriez dû:

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d'utiliser BEPANTHEN 5 %, crème:

N'utilisez pas de quantité double pour compenser la quantité que vous avez oublié d'utiliser.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, BEPANTHEN 5 %, crème est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- Risque d'eczéma dû à l'un des constituants (graisse de laine ou lanoline, propylèneglycol).

Ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER BEPANTHEN 5 %, CRÈME ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser BEPANTHEN 5 %, crème après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient BEPANTHEN 5 %, crème ?

La substance active est:

Dexpanthénol 5 g

Pour 100 g.

Les autres composants sont:

DL-pantolactone, phénoxyéthanol, amphisol K, alcool cétylique, alcool stéarylique, graisse de laine, myristate d'isopropyle, propylèneglycol, eau purifiée.

Qu'est-ce que BEPANTHEN 5 %, crème et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de crème. Tube de 3,5 g, 30 g, 90 g ou 100 g.

Titulaire

BAYER HEALTHCARE SAS
220 AVENUE DE LA RECHERCHE
59120 LOOS

Exploitant

BAYER HEALTHCARE SAS
33 RUE DE L'INDUSTRIE
74240 GAILLARD

Fabricant

GP GRENZACH PRODUKTIONS GMBH
EMIL BARREL STRASSE 7
79639 GRENZACH-WYHLEN
ALLEMAGNE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 23/07/2014.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).