

VITARUTINE, collyre en solution

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consulter un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE VITARUTINE, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER VITARUTINE, collyre en solution ?
3. COMMENT UTILISER VITARUTINE, collyre en solution ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER VITARUTINE, collyre en solution ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE VITARUTINE, COLLYRE EN SOLUTION ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

S01X - AUTRES MÉDICAMENTS OPHTALMOLOGIQUES

(S = organe sensoriel)

Ce médicament est un collyre (gouttes oculaires) à visée vasculoprotectrice.

Il est préconisé en cas de fragilité des petits vaisseaux de la conjonctive de l'œil (blanc de l'œil).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER VITARUTINE, COLLYRE EN SOLUTION ?

N'utilisez jamais VITARUTINE, collyre en solution dans les cas suivants:

- antécédents d'allergie à l'un des constituants du collyre (notamment au thiomersal, composé organomercurel).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec VITARUTINE, collyre en solution

Mises en garde spéciales

Ne pas injecter, ne pas avaler.

Le collyre ne doit pas être administré en injection péri ou intra-oculaire.

En cas d'allergie, arrêter le traitement.

Précautions d'emploi

- Prévenir votre médecin en cas d'allergie connue aux dérivés mercuriels (thiomersal).
- En cas d'hémorragie de la conjonctive, une consultation chez votre ophtalmologiste est indispensable.
- Du fait de la présence d'un conservateur (thiomersal), le port de lentilles souples est déconseillé lors du traitement par ce collyre.
- En cas de traitement concomitant par un collyre, espacer de 15 minutes les instillations.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

L'efficacité d'un collyre peut être affectée par l'instillation simultanée d'un autre collyre.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement

Informez votre médecin en cas de grossesse ou de désir de grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire: thiomersal.

3. COMMENT UTILISER VITARUTINE, COLLYRE EN SOLUTION ?

Posologie

Instiller 1 goutte dans l'œil malade, 4 à 6 fois par jour.

Mode et voie d'administration

Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE.

Pour une bonne utilisation du collyre, certaines précautions doivent être prises:

- Se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'application.
- Éviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières.
- Instiller 1 goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival de l'œil malade, en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.
- Refermer le flacon aussitôt après utilisation et le conserver dans son emballage d'origine.

Fréquence d'administration

4 à 6 instillations à répartir au cours de la journée.

Durée du traitement

Se conformer à l'avis de votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, VITARUTINE, collyre en solution est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité de:

- réactions allergiques,
- de sensation de brûlures transitoires,
- En raison de la présence de thiomersal, comme conservateur: risque d'eczéma et de réactions allergiques, risque de coloration du cristallin, d'inflammation de la cornée (œil).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER VITARUTINE, COLLYRE EN SOLUTION ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser VITARUTINE, collyre en solution après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à température inférieure à 25°C.

Ce médicament ne doit pas être conservé plus de 15 jours après la première utilisation.

Notez la date d'ouverture du flacon en clair sur l'emballage.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient VITARUTINE, collyre en solution ?

La substance active est:

Nicotinamide 0,500 g

Sulfuritoside sodique⁽¹⁾ 0,200 g

Pour 100 ml.

⁽¹⁾Composition du SULFORUTOSIDE SODIQUE: mélange des sels de sodium de différents sulfates de rutosite.

Les autres composants sont:

Borax, acide borique, mercuriothiolate sodique, eau purifiée.

Qu'est-ce que VITARUTINE, collyre en solution et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de collyre. Flacon de 10 ml.

Titulaire

Laboratoires EUROPHTA
"Les Industries"
2, rue du Gabian
98000 Monaco
MONACO

Exploitant

EUROPHTA
Les Industries
2, rue du Gabian
98000 MONACO

Fabricant

EXCELVISION
Rue de la Lombardiere
07100 ANNONAY

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 19/07/2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).