

NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose

Povidone

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose ?
3. COMMENT UTILISER NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 MG/0,4 ML), COLLYRE EN SOLUTION EN RÉCIPIENT UNIDOSE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique: Autres médicaments ophtalmologiques, code ATC: S01XA20

NUTRIVISC contient une substance active, la povidone. Cette substance remplace et joue le même rôle que les larmes.

Ce médicament est utilisé pour traiter la sécheresse de l'œil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 MG/0,4 ML), COLLYRE EN SOLUTION EN RÉCIPIENT UNIDOSE ?

N'utilisez jamais NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose:

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (la povidone) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. [Vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6.](#)

Faites attention avec NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose:

- N'avalez pas et n'injectez pas ce médicament.
- Lavez-vous les mains avant l'application.
- Ne touchez pas votre œil avec l'extrémité du flacon pour éviter le risque de contamination du collyre et de blessure à l'œil.
- Ce collyre est présenté en flacon à usage unique (unidose) et ne contient pas de conservateur. L'unidose doit être jetée immédiatement après usage et ne doit pas être conservée en vue d'une utilisation ultérieure.
- Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez votre médecin.
- Si vous devez utiliser un autre collyre, attendez 15 minutes entre les deux applications. NUTRIVISC doit toujours être appliqué en dernier.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse

L'utilisation de NUTRIVISC peut être envisagée au cours de la grossesse si nécessaire.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

L'utilisation de NUTRIVISC peut être envisagée chez la femme en période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Une vision trouble peut affecter l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Dans ce cas, attendez le rétablissement d'une vision normale avant de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines.

3. COMMENT UTILISER NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 MG/0,4 ML), COLLYRE EN SOLUTION EN RÉCIPIENT UNIDOSE ?

Posologie

Adultes (y compris les personnes âgées):

Appliquez 1 goutte de collyre, 4 fois par jour ou selon la prescription en fonction de la gravité des symptômes.

Mode d'administration

Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE.

Lors de l'utilisation de ce collyre, veuillez respecter les étapes suivantes:

1. Lavez-vous soigneusement les mains avant de manipuler le collyre.
- 2- Détachez et ouvrez l'unidose en tournant le bouchon.
- 3- Évitez le contact de l'embout de l'unidose avec l'œil ou les paupières, pour éviter le risque de contamination du collyre et de blessure à l'œil.
4. Tirez légèrement la paupière inférieure vers le bas en regardant en haut.
5. Déposez une goutte de collyre dans l'espace formé.
- 6- Jetez l'unidose immédiatement après utilisation.
- 7- Après ouverture, ne conservez pas l'unidose pour une administration ultérieure.

Fréquence d'administration

Appliquez une goutte de collyre lorsque les troubles oculaires (sécheresse, brûlures, démangeaisons) se font sentir.

Si vous avez utilisé plus de NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose que vous n'auriez dû:

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir:

Affections oculaires

Fréquence indéterminée: sensation transitoire de brûlure ou de paupières collées, vision trouble.

Affections du système immunitaire

Fréquence indéterminée: réactions d'irritation, réactions allergiques au médicament.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 MG/0,4 ML), COLLYRE EN SOLUTION EN RÉCIPIENT UNIDOSE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C et à l'abri de la lumière.

Jeter après usage.

Ne pas conserver après ouverture.

NE PAS UTILISER une unidose qui aurait été endommagée.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose ?

La substance active est:

Povidone 20,00 mg

Pour un récipient unidose.

Les autres composants sont:

Acide borique, chlorure de sodium, lactate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

Qu'est-ce que NUTRIVISC 5 POUR CENT (20 mg/0,4 ml), collyre en solution en récipient unidose et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de collyre.

Boîte de 5, 10, 20, 30 ou 100 récipients unidoses.

Titulaire

LABORATOIRES ALCON
2-4, RUE HENRI SAINTE-CLAIRE DEVILLE
92563 RUEIL-MALMAISON

Exploitant

LABORATOIRES ALCON
4, RUE HENRI SAINTE-CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL-MALMAISON

Fabricant

EXCELVISION
RUE DE LA LOMBARDIERE
07100 ANNONAY
ou
S.A. ALCON-COUVREUR N.V.
RIJKSWEG 14
B-2870 PUURS
BELGIQUE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 11/04/2016.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).