

SYMPATHYL, comprimé pelliculé

Eschscholtzia, Aubépine, Oxyde de magnésium lourd

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE SYMPATHYL, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SYMPATHYL, comprimé pelliculé ?
3. COMMENT PRENDRE SYMPATHYL, comprimé pelliculé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER SYMPATHYL, comprimé pelliculé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE SYMPATHYL, COMPRIMÉ PELLICULÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

PHYTOTHERAPIE ET ELEMENTS MINERAUX A VISEE SEDATIVE.

Ce médicament est un léger calmant.

Il est préconisé chez l'adulte:

- pour réduire la nervosité ou en cas de perception exagérée des battements cardiaques (palpitations) après que toute maladie cardiaque ait été écartée.
- en cas de troubles légers du sommeil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SYMPATHYL, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Ne prenez jamais SYMPATHYL, comprimé pelliculé:

- si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des constituants contenus dans SYMPATHYL, comprimé pelliculé.
- Si vous êtes atteints d'insuffisance rénale sévère (défaillance des fonctions du rein).

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, sauf avis contraire de votre médecin, dans le cas suivant:

- en cas de traitement par les quinidiniques.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Faites attention avec SYMPATHYL, comprimé pelliculé:

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E122) et peut provoquer des réactions allergiques.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Vous ne devez généralement pas utiliser ce médicament, sauf avis contraire de votre médecin, en même temps que certains médicaments utilisés contre les troubles du rythme cardiaque (quinidiniques).

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de SYMPATHYL, comprimé pelliculé:

Liste des excipients à effet notable: Azorubine (E122).

3. COMMENT PRENDRE SYMPATHYL, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Posologie

Réservé à l'adulte.

La dose habituelle est de 4 comprimés par jour en deux prises, soit 2 comprimés le matin et 2 comprimés le soir, avant le repas.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Avaler les comprimés avec un verre d'eau.

Fréquence d'administration

Matin et soir avant les repas.

Durée du traitement

Le traitement ne doit pas être prolongé sans avis médical.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, SYMPATHYL, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Rares troubles digestifs (diarrhées, douleurs abdominales).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER SYMPATHYL, COMPRIMÉ PELLICULÉ ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser SYMPATHYL, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient SYMPATHYL, comprimé pelliculé ?

Les substances actives sont:

Eschscholtzia (extrait aqueux sec)	20,00 mg
Aubépine (extrait hydroalcoolique sec de sommité fleurie)	75,00 mg
Oxyde de magnésium lourd	124,35 mg
Quantité correspondant à 75 mg de magnésium élément, soit	6,2 mEq

Pour un comprimé pelliculé.

Les autres composants sont:

Cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique (type A), acide stéarique micronisé, gomme laque, polyvidone, monoglycéride acétylé, hypromellose, dioxyde de titane, macrogol 6000, laque indigo carminé, azorubine, oxyde de fer jaune.

Qu'est-ce que SYMPATHYL, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé.

Boîte de 40, 60, 120 ou 600 comprimés.

Titulaire

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
22, AVENUE ARISTIDE BRIAND
94110 ARCUEIL

Exploitant

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
22, AVENUE ARISTIDE BRIAND
94110 ARCUEIL

Fabricant

INNOTHERA CHOUZY
RUE RENE CHANTEREAU
L'ISLE VERT
41150 CHOUZY SUR CISSE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 27/05/2010.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).