

ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 MG, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est une vitamine du groupe B indiqué dans:

- la prévention primaire des anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural chez les femmes sans antécédent particulier et qui désirent concevoir.
- carences en acide folique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 MG, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé dans les cas suivants:

- allergie à l'un des constituants

Faites attention avec ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg, comprimé:

Mises en garde spéciales

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, en particulier phénobarbital, phénytoïne, primidone, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT PRENDRE ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 MG, COMPRIMÉ ?

Posologie

La posologie usuelle est de 1 comprimé par jour.

Pour être efficace, la prévention doit être entreprise 4 semaines avant la conception et se poursuivre 8 semaines après celle-ci.

Mode d'administration

Voie orale

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus d'ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé que vous n'auriez dû: demander l'avis de votre médecin

Si vous oubliez de prendre ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé: ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- rares cas de réactions allergiques cutanées;
- possibilité de troubles gastro-intestinaux.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 MG, COMPRIMÉ ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Ne pas utiliser ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver dans le conditionnement primaire d'origine, à l'abri de la lumière.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé ?

La substance active est:

Acide folique 0,4 mg

Pour un comprimé.

Les autres composants sont:

Cellulose microcristalline, amidon de maïs pré-gélatinisé, trisilicate de magnésium, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre

Qu'est-ce que ACIDE FOLIQUE CCD 0,4 mg comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé.

Boîte de 30, 200, 500, 750 ou 1000 comprimés.

Titulaire

laboratoire c.c.d.
48 rue des petites ecuries
75010 paris

Exploitant

laboratoire c.c.d.
48 rue des petites ecuries
75010 paris

Fabricant

LABORATOIRE BAILLY- CREAT
CHEMIN DE NUISEMENT
LIEU-DIT LES 150 ARPENTS
28500 VERNOUILLET
ou
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES RODAEL
1 ROUTE DE SOCX

ZAC DU BIERENDYCK ET DE LA CROIX ROUGE

59380 BIERNE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/03/2013.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).