

# MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée

Nitrate d'éconazole

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée ?
3. COMMENT UTILISER MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## **1. QU'EST-CE QUE MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, POUFRE POUR APPLICATION CUTANÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Ce médicament est une poudre pour application locale contenant un antifongique de la famille des imidazolés.

Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines affections cutanées dues à des champignons (mycoses).

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, POUFRE POUR APPLICATION CUTANÉE ?**

**N'utilisez jamais MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée dans les cas suivants:**

- Hypersensibilité à l'un des composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Faites attention avec MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée:**

### **Précautions d'emploi**

- Evitez les applications près des yeux.
- En cas d'application chez l'enfant, sur une grande surface, ou sur une peau lésée, respectez impérativement les recommandations et la posologie indiquée par votre médecin en raison de la pénétration plus importante du produit dans ces circonstances.
- Evitez les applications dans les situations où le phénomène d'occlusion locale peut se reproduire (par exemple sujets âgés, escarres, intertrigo sous mammaire).

*EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

*NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.*

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance, notamment si vous prenez des anticoagulants oraux.

### **Grossesse et allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

## **3. COMMENT UTILISER MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, POUFRE POUR APPLICATION CUTANÉE ?**

### **Posologie/Mode d'administration/Fréquence d'administration**

Médicament à usage local:

- Poudrer les régions atteintes et de leur périphérie 2 fois par jour, après toilette et séchage de la peau.

### **Durée de traitement**

La durée du traitement est de 2 à 4 semaines selon la mycose, elle peut être plus longue pour certaines localisations. L'utilisation régulière du produit pendant toute la durée du traitement est déterminante pour la réussite du traitement.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- Démangeaisons, irritation, sensation de brûlure, rougeurs: il faut en avertir votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, POUFRE POUR APPLICATION CUTANÉE ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

**Que contient MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée ?**

### **La substance active est:**

Nitrate d'éconazole ..... 1 g

Pour 100 g.

### **Les autres composants sont:**

Talc, silice colloïdale anhydre (AEROSIL 300), oxyde de zinc léger.

**Qu'est-ce que MYCOAPAYSYL 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour application cutanée. Boîte de 1 flacon.

### **Titulaire**

MERCK MEDICATION FAMILIALE SAS  
37, rue Saint-Romain  
69379 Lyon Cedex 08

### **Exploitant**

MERCK MEDICATION FAMILIALE  
18 C, boulevard Winston Churchill  
21000 DIJON

### **Fabricant**

MERCK SANTE S.A.S.  
Centre de production de LACASSAGNE  
115, avenue Lacassagne

69003 LYON

ou

FAMAR LYON

29 avenue Charles de Gaulle

69230 SAINT GENIS LAVAL

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 06/06/2011.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).