

## BECOZYME, comprimé enrobé

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BECOZYME, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BECOZYME, comprimé enrobé ?
3. COMMENT PRENDRE BECOZYME, comprimé enrobé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER BECOZYME, comprimé enrobé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE BECOZYME, COMPRIMÉ ENROBÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

VITAMINES.

(A: Appareil digestif et métabolisme).

Ce médicament est indiqué dans les états de fatigue passagers.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE BECOZYME, COMPRIMÉ ENROBÉ ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais BECOZYME, comprimé enrobé dans les cas suivants:**

- antécédent d'allergie à l'un des constituants,
- en association avec la lévodopa.

**Faites attention avec BECOZYME, comprimé enrobé:**

Ne pas dépasser la posologie recommandée.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments:**

Ce médicament est contre-indiqué en association avec la lévodopa.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse - Allaitement**

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

En cas d'allaitement, éviter de prendre ce médicament.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines:**

**Liste des excipients à effet notoire:**

Lactose, saccharose.

### 3. COMMENT PRENDRE BECOZYME, COMPRIMÉ ENROBÉ ?

**Posologie**

RESERVE A L'ADULTE.

2 à 4 comprimés par jour.

**Mode et voie d'administration**

Voie orale

Les comprimés sont à avaler avec un peu d'eau.

**Durée du traitement**

NE PAS UTILISER PLUS DE 4 SEMAINES SANS AVIS MEDICAL.

**Si vous avez pris plus de BECOZYME, comprimé enrobé que vous n'auriez dû:**

Un surdosage n'est pas attendu aux posologies préconisées, d'autant plus que tous les cas rapportés étaient associés à la prise concomitante de préparations mono ou poly-vitaminées à fortes doses.

Les symptômes de surdosage peuvent être une confusion, des troubles gastro-intestinaux (tels que constipation, diarrhée, nausées et vomissements), voire des troubles neurologiques.

En cas d'apparition de tels symptômes, interrompre le traitement et consulter un médecin.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, BECOZYME, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- Coloration jaune des urines.
- Rarement: manifestations cutanées.
- Manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement suite à des fortes doses et/ou en cures prolongées.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER BECOZYME, COMPRIMÉ ENROBÉ ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser BECOZYME, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient BECOZYME, comprimé enrobé ?**

**Les substances actives sont:**

Nitrate de thiamine (Vitamine B <sub>1</sub> ) .....	15,000 mg
Riboflavine (Vitamine B <sub>2</sub> ) .....	15,000 mg
Nicotinamide (Vitamine PP) .....	50,000 mg
Chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B <sub>6</sub> ) .....	10,000 mg
Pantothénate de calcium (Vitamine B <sub>5</sub> ) .....	25,000 mg

Pour un comprimé enrobé.

**Les autres composants sont:**

Povidone K 90, povidone K 30, oxyde de magnésium léger, talc, stéarate de magnésium, lactose monohydraté, laque de copolymère, amidon de riz, gomme arabique, oxyde de fer

rouge, oxyde de fer noir, oxyde de fer jaune, paraffine solide, paraffine liquide, saccharose.

**Qu'est-ce que BECOZYME, comprimé enrobé et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé enrobé.

Boîte de 20, 30 ou 40 comprimés.

**Titulaire**

BAYER HEALTHCARE SAS  
220 AVENUE DE LA RECHERCHE  
59120 LOOS

**Exploitant**

BAYER HEALTHCARE SAS  
33 RUE DE L'INDUSTRIE  
74240 GAILLARD

**Fabricant**

DRAGENOPHARM APOTHEKER PUSCHL GMBH & CO. KG  
GOLLSTRASSE 1  
84529 TITTMONING  
ALLEMAGNE  
ou  
BAYER SANTE FAMILIALE  
33, RUE DE L'INDUSTRIE  
74240 GAILLARD

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 23/07/2014.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).