

EDUCTYL ENFANTS, suppositoire effervescent

Tartrate acide de potassium / Bicarbonate de sodium

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE EDUCTYL ENFANTS, suppositoire effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER EDUCTYL ENFANTS, suppositoire effervescent ?
3. COMMENT UTILISER EDUCTYL ENFANTS, suppositoire effervescent ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER EDUCTYL ENFANTS, suppositoire effervescent ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE EDUCTYL ENFANTS, SUPPOSITOIRE EFFERVESCENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Ce médicament est un laxatif par voie rectale. Il agit en déclenchant le réflexe de défécation.

Ce médicament est préconisé dans certaines constipations et comme préparation à certains examens du rectum (rectoscopie).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER EDUCTYL ENFANTS, SUPPOSITOIRE EFFERVESCENT ?

N'utilisez jamais EDUCTYL ENFANTS, suppositoire effervescent dans les cas suivants:

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des composants.
- Si votre enfant souffre de douleurs abdominales intenses d'origine non déterminée.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec EDUCTYL ENFANTS, suppositoire effervescent:

Mise en garde

PAS D'UTILISATION PROLONGEE SANS AVIS MEDICAL

Constipation occasionnelle:

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexpiquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée):

Elle peut être liée à deux causes:

- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,
- soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autres:

- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits...)
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits
- une augmentation des activités physiques (sport, marche...)
- une rééducation du réflexe de défécation
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

Cas particulier de l'enfant:

Chez l'enfant le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et de diététique: notamment utilisation de la bonne quantité d'eau avec les poudres de laits infantiles, alimentation riche en produits d'origine végétale, adjonction de jus de fruits.

Le traitement par un laxatif par voie rectale sans avis médical est contre-indiqué (la prise régulière peut entraver le fonctionnement normal du réflexe de défécation).

Précautions d'emploi

En cas de fissure anale, il faut demander avis à votre médecin.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - allaitement

Ce médicament dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé ponctuellement pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER EDUCTYL ENFANTS, SUPPOSITOIRE EFFERVESCENT ?

La posologie est en moyenne de 1 suppositoire par jour, quelques minutes avant le moment choisi pour l'exonération.

Si vous avez utilisé plus de EDUCTYL ENFANTS, suppositoire effervescent que vous n'auriez dû:

Un usage prolongé risque d'entraîner des brûlures anales et une inflammation du rectum.

Si vous avez administré à votre enfant plus de EDUCTYL ENFANTS, suppositoire effervescent qu'il ne fallait, consultez votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- rarement sensation de brûlures anales.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER EDUCTYL ENFANTS, SUPPOSITOIRE EFFERVESCENT ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser EDUCTYL ENFANTS, suppositoire effervescent après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient EDUCTYL ENFANTS, suppositoire effervescent ?

Les substances actives sont:

Tartrate acide de potassium 0,5750 g

Bicarbonate de sodium 0,3500 g

Pour un suppositoire.

Les autres composants sont:

Lécithine de soja, talc, glycérides hémi-synthétiques solides (Witepsol H 15).

Qu'est-ce que EDUCTYL ENFANTS, suppositoire effervescent et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de suppositoire effervescent. Boîte de 12 suppositoires effervescents.

Titulaire

LABORATOIRES TECHNI-PHARMA
7, RUE DE L'INDUSTRIE
BP 717
98014 MONACO CEDEX

Exploitant

LABORATOIRES TECHNI-PHARMA
7, RUE DE L'INDUSTRIE
MC 98000 MONACO

Fabricant

LABORATOIRES TECHNI-PHARMA
7, RUE DE L'INDUSTRIE
MC 98000 MONACO

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 07/09/2015.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).