

## SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ?
3. COMMENT UTILISER SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

LAXATIF PAR VOIE RECTALE.

Ce médicament est un suppositoire. Il est préconisé dans certaines constipations et comme préparation à certains examens (rectoscopie).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ?

N'utiliser jamais SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants.
- Hypersensibilité au glycérol ou à l'un des excipients.
- Colopathie obstructive, compte tenu de l'effet laxatif du médicament.
- Syndrome douloureux abdominal de cause indéterminée et inflammatoire (rectocolite ulcéreuse, maladie de Crohn...).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Faites attention avec SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES :

#### **Mise en garde**

PAS D'UTILISATION PROLONGEE SANS AVIS MEDICAL.

#### **Constipation occasionnelle :**

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexplicée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

#### **Constipation chronique (constipation de longue durée) :**

Elle peut être liée à deux causes:

- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,
- soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autres :

- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits...)
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits,
- une augmentation des activités physiques (sport, marche...),
- une rééducation du réflexe de défécation,
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### **Précautions d'emploi**

Il est préférable d'éviter l'utilisation de ce médicament en cas de crise hémorroïdaire, de fissure anale ou de rectocolite hémorragique.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement

Ce médicament dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé ponctuellement pendant la grossesse et l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### 3. COMMENT UTILISER SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ?

#### **Posologie**

Le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide pour en faciliter l'introduction.

**Adultes :** 1 suppositoire 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour aller à la selle à renouveler 1 fois dans la demi-heure ou l'heure qui suit en cas de constipation rebelle.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez utilisé plus de SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES que vous n'auriez dû :

- En cas d'utilisation excessive ou prolongée, risque accru de rectites et de diarrhée. Traitement : arrêt du traitement ou diminution de la posologie.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- sensation de brûlures anales.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Ce médicament doit être conservé à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES ?

#### **La substance active est :**

Glycérol ..... 1,92 g  
pour un suppositoire

#### **Les autres composants sont :**

Gélatine, eau purifiée.

Qu'est-ce que SUPPOSITOIRES A LA GLYCERINE MONOT ADULTES et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de suppositoires ; Boîte de 10, 25, 50 et 100 suppositoires.

**Titulaire**

MERCK MEDICATION FAMILIALE SAS  
37 rue Saint-Romain  
69379 Lyon Cedex 08

**Exploitant**

MERCK MEDICATION FAMILIALE  
18 C, boulevard Winston Churchill  
21000 DIJON  
(Siège social: 37, rue Saint Romain - 69008 LYON)

**Fabricant**

SOCIETE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE ET D'HYGIENE (S.P.P.H.)  
7 impasse des Bousseots  
21800 QUETIGNY-LES-DIJON

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 27/09/2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).