

COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable

Embonate de Pyrantel

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable ?
3. COMMENT PRENDRE COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE COMBANTRIN 125 MG/2,5 ML, SUSPENSION BUVABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTIHELMINTIQUÉ

(P: Parasitologie)

Ce médicament est un antiparasitaire.

Il est préconisé dans le traitement des parasitoses telles que l'ascaridiose, l'oxyurose et l'ankylostomiase.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE COMBANTRIN 125 MG/2,5 ML, SUSPENSION BUVABLE ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable :

- en cas d'allergie à l'un des composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Faites attention avec COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable :

Ce médicament contient du glycérol et peut provoquer des céphalées et des troubles digestifs (diarrhée).

En raison de la présence de sorbitol, ce médicament peut provoquer des troubles digestifs légers (diarrhée). Valeur calorique 2, 6 kcal/g de sorbitol.

Ce médicament contient du sorbitol. L'utilisation de ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladies héréditaires rares).

Précautions d'emploi

A utiliser AVEC PRECAUTION en cas de maladie du foie.

Oxyurose

Pour empêcher la réinfestation, il faut pratiquer une hygiène rigoureuse: toilette quotidienne de la région anale, brossage des ongles plusieurs fois par jour. Chez l'enfant, couper les ongles très court. Changer régulièrement de sous-vêtements et de vêtements de nuit. Eviter de se gratter. Traiter tous les membres de la famille en même temps car il est fréquent que l'infestation ne s'accompagne d'aucun symptôme.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et Allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

Par prudence, éviter l'administration de ce médicament pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notable: Benzoate de sodium, glycérol, sorbitol à 70 pour cent cristallisable.

3. COMMENT PRENDRE COMBANTRIN 125 MG/2,5 ML, SUSPENSION BUVABLE ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 12 Kg.

Oxyures

La posologie usuelle est de 10 mg/kg à 12 mg/kg en prise unique chez l'adulte et chez l'enfant, soit:

- chez l'enfant: environ ½ cuillère-mesure correspondant à la graduation 2,5 ml par 10 kg de poids.
- chez l'adulte de moins de 75 kg: environ 3 cuillères-mesures.
- chez l'adulte de plus de 75 kg: environ 4 cuillères-mesures.

Dans l'oxyurose, respecter des mesures d'hygiène rigoureuse et traiter également l'entourage.

Pour éviter une réinfection, prescrire une 2^{ème} prise 2 à 3 semaines après la prise initiale.

Ascaridiose et Ankylostomiase

Se conformer à la prescription de votre médecin.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE:

- **IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS**
- **NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE**

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Durée du traitement

En cas d'oxyurose, le traitement: se fait en une seule prise. Répéter la prise 3 semaines après.

En cas d'ascaridiose et d'ankylostomiase, suivre les recommandations de votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Rarement:

- troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, anorexie, diarrhées, douleurs abdominales).
 - augmentation faible et passagère de certaines enzymes du foie (transaminases).
- Exceptionnellement: maux de tête, vertiges, fatigue, troubles du sommeil, éruption cutanée.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER COMBANTRIN 125 MG/2,5 ML, SUSPENSION BUVABLE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable ?

La substance active est:

Pyrantel (embonate de) 14,410 g
(Quantité correspondante en PYRANTEL base 5,000 g)

Pour 100 ml de suspension buvable

½ cuillère-mesure correspond à la graduation de 2,5 ml = 125 mg de pyrantel

1 cuillère-mesure correspond à la graduation de 5 ml = 250 mg de pyrantel

Les autres composants sont:

Excipients: acide citrique monohydraté, siméticone, benzoate de sodium, arôme caramel, arôme cassis, glycérol, lécithine de soja, povidone, sorbitol à 70 pour cent cristallisable, polysorbate, silicat d'aluminium et de magnésium, eau purifiée.

Qu'est-ce que COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de suspension buvable. Boîte de 1 flacon de 15 ml avec une cuillère-mesure de 5 ml.

Titulaire

TEOFARMA S.R.L.
Via F.lli cervi n° 8
27010 Valle Salimbene (PV)
ITALIE

Exploitant

TEOFARMA S.r.l
Via F.lli Cervi n° 8
27010 VALLE SALIMBENE (PV)
ITALIE

Fabricant

TEOFARMA S.R.L.
Viale certosa, 8/a
27100 pavia (pv)
ITALIE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 26/03/2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).