

# STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule

Citrulline (malate de)

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule ?
3. COMMENT PRENDRE STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## **1. QU'EST-CE QUE STIMOL 1 G/10 ML, SOLUTION BUvable EN AMPOULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

A VISEE ANTI-ASTHENIQUE

(A: Appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est préconisé dans les états de fatigue passagers.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE STIMOL 1 G/10 ML, SOLUTION BUvable EN AMPOULE ?**

**Ne prenez jamais STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule dans le cas suivant:**

- allergie connue à l'un des constituants.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Faites attention avec STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule:**

**Précautions d'emploi**

- En cas de régime hyposodé, tenir compte dans la ration journalière de la présence de 30 mg de sodium par ampoule.
- En raison du pH acide, les ampoules doivent toujours être diluées dans un verre d'eau.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Prise ou utilisation d'autres médicaments:**

**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

**Grossesse et allaitement**

L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament. Excipient à effet notoire: sodium.

## **3. COMMENT PRENDRE STIMOL 1 G/10 ML, SOLUTION BUvable EN AMPOULE ?**

**Posologie**

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

**Adulte:**

3 ampoules par jour, en les répartissant au cours de la journée.

**Enfant:**

2 ampoules par jour, en les répartissant au cours de la journée.

Diluer les ampoules dans un verre d'eau.

Durée de traitement limitée à 4 semaines.

**Mode et voie d'administration**

Voie orale

**Durée du traitement**

NE PAS UTILISER PLUS DE 4 SEMAINES

**Si vous avez pris plus de STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule que vous n'auriez dû:**

Un surdosage éventuel risque d'entraîner une aggravation des effets indésirables (troubles gastro-intestinaux).

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- rares: légères brûlures d'estomac en début de traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER STIMOL 1 G/10 ML, SOLUTION BUvable EN AMPOULE ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de conditions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

**Que contient STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule ?**

**La substance active est:**

Malate de citrulline ..... 1,00 g

Pour une ampoule de 10 ml.

**Les autres composants sont:**

Arôme naturel d'orange sangria, solution d'hydroxyde de sodium à 30 % (m/m), eau purifiée.

**Qu'est-ce que STIMOL 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en ampoule de 10 ml. Boîte de 18 ampoules.

**Titulaire**

BIOCODEX  
7, AVENUE GALLIENI  
94250 GENTILLY

**Exploitant**

BIOCODEX  
7, AVENUE GALLIENI  
94250 GENTILLY

**Fabricant**

A compléter

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 01/04/2016.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).