

# FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, sirop

Benzoate de méglumine / Polysorbate 20

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, sirop ?
3. COMMENT PRENDRE FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, sirop ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, sirop ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, SIROP ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

MUCOLYTIQUE

(R. Système respiratoire)

Traitement d'appoint des troubles de la sécrétion bronchique.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, SIROP ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, sirop dans les cas suivants:**

- en cas d'allergie connue à l'un des constituants;
- chez le nourrisson (moins de 2 ans) en raison du risque d'aggravation de l'encombrement bronchique.

Ce médicament est GENELEMENT DECONSEILLE pendant la grossesse ([cf. Grossesse et Allaitement](#)).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Mises en garde spéciales**

Ne pas prendre de médicament antitussifs ou de médicaments asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par ce médicament.

Consulter votre médecin:

- en cas d'expectoration purulente, de fièvre,
- en cas de maladie chronique des bronches ou des poumons.

Le traitement ne devra pas être poursuivi en cas d'aggravation des symptômes. Dans ce cas, consultez votre médecin pour une réévaluation de votre traitement.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Précautions d'emploi**

En cas de diabète ou de régime pauvre en sucre, tenir compte de l'apport en sucre:

- 3,6 g de par cuillère à café
- 10,8 g par cuillère à soupe.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Prise ou utilisation d'autres médicaments:**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse - Allaitement**

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse.

Par prudence, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant l'allaitement.

**D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.**

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'a été rapporté.

**Liste des excipients à effet notable:** saccharose

## 3. COMMENT PRENDRE FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, SIROP ?

**Posologie**

La posologie usuelle est:

Chez l'adulte et l'enfant à partir de 12 ans: 2 à 4 cuillères à soupe par jour.

Chez l'enfant de 6 à 12 ans: 4 à 8 cuillères à café par jour.

Chez l'enfant de 30 mois à 6 ans: 3 à 4 cuillères à café par jour.

Chez l'enfant de 24 à 30 mois: 1 à 3 cuillères à café par jour.

**Dans tous les cas, respectez l'ordonnance de votre médecin.**

**Mode et voie d'administration**

Voie orale.

**Durée du traitement**

Ne pas dépasser 8 jours de traitement sans avis médical.

**Si vous avez pris plus FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, sirop qu'il ne fallait:**

Le surdosage risque d'aggraver le surencombrement bronchique ([voir Quels sont les effets indésirables éventuels ?](#)).

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, sirop est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Risque d'aggravation de l'encombrement bronchique notamment chez le nourrisson et chez certains patients incapables d'expectoration efficace.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, SIROP ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, sirop après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de la lumière.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, sirop ?**

**Les substances actives sont:**

Benzoate de méglumine  
Quantité correspondant en produit anhydre à ..... 2,6 g  
Polysorbate 20 ..... 0,3 g

Pour 100 ml de sirop.

1 cuillère à café contient 3,6 g de saccharose

1 cuillère à soupe contient 10,8 g de saccharose

**Les autres composants sont:**

Colorant glucosique E150\*, saccharose, arôme caramel\*\*, eau purifiée.

\*Composition du colorant glucosique: glucose, ammoniacque

\*\*Composition de l'arôme caramel: vanilline, pipéronal, gamma nonalactone, maltol, acétylméthylcarbinol, propylèneglycol

**Qu'est-ce que FLUISEDAL SANS PROMETHAZINE, sirop et contenu de l'emballage**

Ce médicament se présente sous la forme de sirop- Flacons de 125 et 250 ml.

**Titulaire**

LABORATOIRE DES REALISATIONS THERAPEUTIQUES ELERTE  
181-183 RUE ANDRE KARMAN  
93303 AUBERVILLIERS CEDEX

**Exploitant**

LABORATOIRES ELERTE  
181 - 183, RUE ANDRE KARMAN  
93303 AUBERVILLIERS CEDEX

**Fabricant**

LABORATOIRE DES REALISATIONS THERAPEUTIQUES ELERTE  
181-183 RUE ANDRE KARMAN  
93300 AUBERVILLIERS

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 27/10/2011.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).