

## ADVILMED 5 %, gel

### Ibuprofène

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

#### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ADVILMED 5 %, gel ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ADVILMED 5 %, gel ?
3. COMMENT PRENDRE ADVILMED 5 %, gel ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ADVILMED 5 %, gel ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### 1. QU'EST-CE QUE ADVILMED 5 %, GEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien.

Il est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans), en traitement local de courte durée:

- des traumatismes bénins de type entorse bénigne, contusions,
- des tendinites (inflammation des tendons).

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ADVIL 5 %, GEL ?

**N'utilisez jamais ADVILMED 5 %, gel dans les cas suivants:**

- à partir du 6<sup>ème</sup> mois de la grossesse,
- antécédent d'allergie à ce médicament ou à un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine,
- antécédent d'allergie à l'un des excipients,
- peau lésée, quelque soit la lésion: lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.

**Faites attention avec ADVILMED 5 %, gel:**

- Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux,
- L'apparition d'une éruption cutanée après application du gel impose l'arrêt immédiat du traitement.
- En cas d'utilisation fréquente par un professionnel de santé, le port de gants est recommandé.

**Respecter les conseils d'utilisation:**

- ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée ([voir Posologie](#)),
- ne pas appliquer sur une surface étendue du corps,
- respecter la fréquence et la durée de traitement.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Grossesse**

Ce médicament ne sera utilisé pendant les 5 PREMIERS MOIS de la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

A partir du 6<sup>ème</sup> mois de la grossesse, vous ne devez EN AUCUN CAS prendre de VOUS MEME ce médicament. Bien que le passage de ce médicament dans la circulation générale soit faible, il ne peut être exclu. Dans ce cas, l'effet de ce médicament sur votre enfant pourrait avoir des conséquences graves, notamment au plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela, même avec une seule application.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### **Allaitement**

Les AINS passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les administrer chez la femme qui allaite.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### 3. COMMENT UTILISER ADVILMED 5 %, GEL ?

##### **Posologie**

La posologie usuelle est de 1 application, 3 fois par jour.

##### **Mode d'administration**

Voie locale.

Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé, sur la région douloureuse ou inflammatoire.

Bien se laver les mains après chaque utilisation.

##### **Durée de traitement**

Le traitement est limité à 5 jours en l'absence de prescription médicale.

**Si vous avez utilisé plus de ADVILMED 5 %, gel que vous n'auriez dû:**

Rincez abondamment à l'eau.

**Si vous oubliez d'appliquer ADVILMED 5 %, gel:**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ADVILMED 5 %, gel est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- Exceptionnellement, peuvent survenir des réactions allergiques:
  - cutanées,
  - respiratoires de type crise d'asthme,
  - générales.

Dans tous ces cas, il faut **immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.**

- Peuvent survenir également:

- des effets locaux cutanés de type rougeurs, démangeaisons,
- d'autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée de traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement fermé.

Dans tous ces cas, **avertir votre médecin.**

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### **« Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à <votre médecin> ou, <votre pharmacien> <ou à votre infirmier/ère>. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament. »

#### 5. COMMENT CONSERVER ADVILMED 5 %, GEL ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ADVILMED 5 %, gel après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient ADVILMED 5 %, gel ?

**La substance active est:**

L'ibuprofène ..... 5,00 g

Pour 100 g.

**Les autres composants sont:**

L'hydroxyéthylcellulose, l'hydroxyde de sodium, l'alcool benzylique, l'alcool isopropylique, l'eau purifiée.

**Qu'est-ce que ADVILMED 5 %, gel et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de gel. Tube de 50, 60 ou 100 g.

**Titulaire**

PFIZER SANTE FAMILIALE  
23-25, avenue du Docteur Lannelongue  
75014 PARIS

**Exploitant**

PFIZER SANTE FAMILIALE  
23-25 rue du Docteur Lannelongue  
75014 PARIS

**Fabricant**

LABORATOIRES CHEMINEAU  
93 ROUTE DE MONNAIE  
37120 VOUVRAY

ou

DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.  
VIA MARTIRI DELLE FOIBE 1  
CORTEMAGGIORE (PC)

ITALIE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 31/07/2013.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).