

# AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé

Chlorhydrate d'ambroxol

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 8 à 10 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 MG, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

MUCOLYTIQUES.

(R: Système respiratoire)

Traitement des troubles de la sécrétion bronchique de l'adulte, notamment au cours des affections bronchiques aiguës et des épisodes aigus des bronchopneumopathies chroniques. Ce médicament est un expectorant. Il facilite l'évacuation par la toux des sécrétions bronchiques.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 MG, COMPRIMÉ ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé** en cas d'antécédents d'allergie à ce médicament ou à l'un des constituants.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Faites attention avec AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé:**

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare).

### Précautions d'emploi

Il est conseillé de ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par ce médicament.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire: lactose.

## 3. COMMENT PRENDRE AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 MG, COMPRIMÉ ?

### Posologie

RESERVE A L'ADULTE.

La posologie de ce médicament est de 1 à 2 comprimés matin et soir.

### Mode d'administration

Voie orale.

### Fréquence d'administration

Les prises seront espacées à intervalle régulier.

### Durée de traitement

La durée du traitement ne dépassera pas 8 à 10 jours sans avis médical.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- Possibilité de survenue de troubles digestifs mineurs à type de nausées, vomissements, brûlure d'estomac.  
Il est conseillé dans ce cas de diminuer la posologie.
- Ont été décrits:
  - des cas de réactions allergiques cutanées à type de rougeur, démangeaison, urticaire,
  - des cas de réactions de type allergique avec œdème de Quincke (gonflement du visage et gêne respiratoire).
  - Dans ce cas, le traitement devra être impérativement interrompu.
- Rarement ont été rapportés des maux de tête ou des vertiges.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 MG, COMPRIMÉ ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé ?**

### La substance active est:

Chlorhydrate d'ambroxol ..... 30,00 mg  
Quantité correspondant à ambroxol base ..... 27,30 mg  
Pour un comprimé.

### Les autres composants sont:

Lactose, cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique, stéarate de magnésium.

**Qu'est-ce que AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé. Boîte de 30.

### Titulaire

#### TEVA SANTE

100-110 Esplanade du Général de Gaulle  
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX

**Exploitant**

**TEVA SANTE**

100-110 Esplanade du Général de Gaulle  
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX

**Fabricant**

TEVA SANTE

Rue Bellocier  
89107 SENS CEDEX

ou

TEVA PHARMACEUTICAL WORKS Co.LTD  
4042 Debrecen

Pallagi ut 13

HONGRIE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 27/03/2014.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).