

# BETADINE 250 mg, ovule

Polyvidone iodée

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BETADINE 250 mg, ovule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BETADINE 250 mg, ovule ?
3. COMMENT UTILISER BETADINE 250 mg, ovule ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER BETADINE 250 mg, ovule ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE BETADINE 250 MG, OVULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antiseptique iodé.

Ce médicament est indiqué dans le traitement local d'appoint de certaines infections vaginales.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BETADINE 250 MG, OVULE ?

**N'utilisez jamais BETADINE 250 mg, ovule:**

- en cas d'antécédents d'intolérance ou d'allergie à l'un des constituants, en particulier à la povidone iodée ou aux produits contenant de la povidone. Il n'existe pas de réaction croisée avec les produits de contraste iodés. Les antécédents d'accidents de type allergique aux produits de contraste iodés ou d'anaphylaxie aux fruits de mer ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation de BETADINE 250 mg, ovule.
  - en cas d'usage répété pendant la grossesse, à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre de la grossesse.
  - en cas d'allaitement.
- BETADINE 250 mg, ovule est GÉNÉRALEMENT DÉCONSEILLÉE, sauf avis contraire de votre médecin:**
- en association avec des produits spermicides et les antiseptiques dérivés du mercure.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

**Faites attention avec BETADINE 250 mg, ovule:**

**Mises en garde spéciales**

NE PAS INTERROMPRE BRUTALEMENT LE TRAITEMENT SANS L'AVIS DE VOTRE MEDECIN.

NE PAS INJECTER, NE PAS AVALER.

**Précautions d'emploi**

L'iode de ce médicament peut traverser la muqueuse et passer dans la circulation générale ([voir Quels sont les effets indésirables éventuels](#)), en particulier en cas d'usage répété ou d'application sur une muqueuse fragilisée. L'utilisation prolongée ou répétée de ce médicament est donc déconseillée. Le passage de l'iode dans la circulation générale est favorisé en cas d'insuffisance rénale.

Ne pas utiliser avec des produits spermicides (risque d'inactivation).

*EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

*NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.*

**Utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance notamment les antiseptiques dérivés du mercure et les produits spermicides (risque d'inactivation), parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse et Allaitement**

En raison de la présence d'iode, l'utilisation de ce médicament, dans le cas d'un usage répété, est contre-indiquée à partir du 2<sup>ème</sup> trimestre.

Il ne sera utilisé à titre occasionnel que sur les conseils de votre médecin.

*Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.*

L'allaitement est contre-indiqué en cas d'usage répété de ce médicament.

*Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.*

## 3. COMMENT UTILISER BETADINE 250 MG, OVULE ?

**Posologie et mode et voie d'administration**

Voie vaginale

RESERVE A L'ADULTE

Mettre en place, chaque soir, un ovule pendant 8 à 16 jours.

L'ovule doit être introduit profondément dans le vagin.

**Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré**

La fréquence de l'administration est déterminée par le médecin selon les besoins de la patiente.

**Durée du traitement**

L'utilisation de ce médicament nécessite au préalable une consultation auprès de votre médecin. Ne pas dépasser la durée de traitement préconisée et respectez les conseils d'utilisation.

**Si vous avez utilisé plus de BETADINE 250 mg, ovule que vous n'auriez dû:**

En cas de surdosage, il peut se produire une surcharge en iode susceptible de modifier le fonctionnement de la glande thyroïde. Consultez rapidement un médecin.

*N'interrompez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin.*

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, BETADINE 250 mg, ovule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Possibilité de surcharge en iode, en cas d'administrations répétées et prolongées pouvant modifier le fonctionnement de la glande thyroïde;
- possibilité d'irritation des muqueuses;
- exceptionnellement, des réactions d'hypersensibilité: urticaire, œdème de Quincke, choc anaphylactique, réaction anaphylactoïde peuvent se produire.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER BETADINE 250 MG, OVULE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser BETADINE 250 mg, ovule après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur

A conserver à une température inférieure ou égale à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient BETADINE 250 mg, ovule ?**

**La substance active est:**

Polyvidone iodée (Titrée à 10% d'iode) ..... 250 mg

Pour un ovule de 2,9 g.

**L'autre composant est:**

Excipients: macrogol 1000.

**Qu'est-ce que BETADINE 250 mg, ovule et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme d'ovule. Boîte de 8 ovules.

**Titulaire**

MEDA PHARMA  
25, BOULEVARD DE L'AMIRAL BRUIX  
75016 PARIS

**Exploitant**

MEDA PHARMA  
25, BOULEVARD DE L'AMIRAL BRUIX  
75016 PARIS

**Fabricant**

MEDA MANUFACTURING  
AVENUE J.F. KENNEDY  
33700 MERIGNAC  
ou  
RECIPHARM PARETS SLU  
RAMON Y CAJAL, 2  
080150 PARETS DEL VALLES  
BARCELONE  
ESPAGNE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 28/01/2016.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).