

NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon

Chlorure de cétylpyridinium

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon ?
3. COMMENT UTILISER NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE NOVOPTINE 2,5 MG/10 ML, COLLYRE EN FLACON ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un collyre (gouttes oculaires) contenant un antiseptique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER NOVOPTINE 2,5 MG/10 ML, COLLYRE EN FLACON ?

N'utilisez jamais NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon dans le cas suivant:

- allergie à certains antiseptiques (ammonium quaternaires)

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon:

Mises en garde

- En cas d'apparition de symptômes anormaux (rougeur et/ou douleur de l'œil), consulter votre médecin.

Précautions d'emploi

- L'utilisation de ce collyre doit être évitée chez les porteurs de lentilles de contact chez qui le risque d'intolérance locale est majoré.
- Respecter la posologie préconisée et ne pas prolonger le traitement au delà de 15 jours.
- Ne pas toucher l'œil avec l'extrémité du flacon.
- Refermer celui-ci soigneusement après usage.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre au minimum 15 minutes entre chaque instillation.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Utilisation d'autres médicaments:

En cas de traitement concomitant par un collyre contenant une substance active différente, espacer de 15 minutes les instillations.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines:

Immédiatement après utilisation, il se peut que votre vision soit troublée.

Faites attention si vous conduisez des véhicules ou si vous utilisez des machines.

3. COMMENT UTILISER NOVOPTINE 2,5 MG/10 ML, COLLYRE EN FLACON ?

En regardant vers le haut et en tirant la paupière inférieure vers le bas, instiller 1 goutte dans l'œil 3 à 4 fois par jour pendant 7 jours.

DANS TOUTS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez utilisé plus de NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- irritation locale

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER NOVOPTINE 2,5 MG/10 ML, COLLYRE EN FLACON ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Ce médicament ne doit pas être conservé plus de 15 jours après ouverture du flacon.

Notez la date de première utilisation en clair sur l'emballage.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon ?

La substance active est:

Chlorure de cétylpyridinium 2,500 mg

Pour un flacon de 10 ml.

Les autres composants sont:

Hydrogénophosphate de sodium anhydre, hydrogénophosphate de potassium, eau purifiée.

Qu'est-ce que NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous la forme d'un collyre en flacon de 10 ml.

Titulaire

GIFRER BARBEZAT
8-10, RUE PAUL BERT
69150 DECINES-CHARPIEU

Exploitant

GIFRER BARBEZAT
8-10 RUE PAUL BERT
69153 DECINES CEDEX

Fabricant

EXCELVISION
RUE DE LA LOMBARDIERE
07100 ANNONAY
ou
GIFRER BARBEZAT
8-10 RUE PAUL BERT
69153 DECINES CEDEX

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 18/06/2013.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).