

# PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur

Nitrate d'éconazole

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur ?
3. COMMENT UTILISER PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## **1. QU'EST-CE QUE PEVARYL 1 POUR CENT, SOLUTION POUR APPLICATION LOCALE EN FLACON PULVÉRISATEUR ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Ce médicament contient un antifongique (actif contre les champignons) de la famille des imidazolés.

Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines mycoses (affections cutanées dues à des champignons).

### **Pityriasis Versicolor**

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER PEVARYL 1 POUR CENT, SOLUTION POUR APPLICATION LOCALE EN FLACON PULVÉRISATEUR ?**

N'utilisez jamais PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des composants contenus dans ce médicament. Vous trouverez la liste à la rubrique 6.

Faites attention avec PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur :

- chez l'enfant
- sur une grande surface de peau
- sur une peau lésée (abîmée)
- dans les situations où le phénomène d'occlusion locale peut se reproduire (par exemple sujets âgés, escarres, lésions sous mammaire).

Dans ces cas, il faut respecter impérativement les recommandations et la posologie indiquée dans la notice car le produit pénètre plus facilement dans la peau.

- Vous devez arrêter d'utiliser ce médicament si une allergie (reconnaissable par des rougeurs, des boutons...) ou une irritation apparaissent.
- Ne pas appliquer dans l'œil, le nez.
- Candidoses: il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication du Candida).
- Ce médicament contient du propylène glycol et peut provoquer des irritations cutanées.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

- Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Prévenez votre médecin si vous prenez un médicament pour fluidifier le sang (les antivitamines K (comme acénocoumarol, fluidione, phénindione, tiocloमारol, warfarine) car PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur peut modifier l'action des antivitamines K chez certaines personnes. Par conséquent, vous devrez surveiller fréquemment l'INR (examens sanguins). Selon votre situation, votre médecin peut également décider de modifier la dose de votre antivitamines K pendant ou après le traitement par PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur.

Grossesse et allaitement

Compte tenu d'un passage systémique limité après application par voie topique et du recul clinique, l'utilisation du PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur est envisageable au cours de la grossesse quel qu'en soit le terme ainsi qu'au cours de l'allaitement.

Ne pas appliquer sur les seins en période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur

Ce médicament contient de l'acide benzoïque et de l'hydroxyanisole butylé (voir le paragraphe "Faites attention avec PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur").

## **3. COMMENT UTILISER PEVARYL 1 POUR CENT, SOLUTION POUR APPLICATION LOCALE EN FLACON PULVÉRISATEUR ?**

Pour USAGE EXTERNE UNIQUEMENT : il s'applique directement sur la peau.

Respectez bien les étapes suivantes pour l'application :

1. Nettoyez la zone atteinte ainsi que son contour, puis séchez bien la peau avant l'application.
2. Appliquez PEVARYL sur et autour de la zone atteinte 2 fois par jour.
3. Massez doucement et régulièrement jusqu'à ce que la crème pénètre complètement.

### **DUREE DE TRAITEMENT**

Pityriasis Versicolor

2 semaines

L'utilisation régulière de produit pendant toute la durée du traitement est déterminante pour la réussite du traitement.

**En cas de non amélioration, consultez un médecin.**

**Si vous avez avalé PEVARYL accidentellement :**

Consultez le médecin afin qu'il vous prescrive un traitement adapté aux effets indésirables qui peuvent survenir suite à cette ingestion.

**Si vous avez accidentellement projeté PEVARYL dans les yeux :**

- Lavez à l'eau claire ou avec une solution saline.
- Si cela ne suffit pas, consultez un médecin.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables fréquents (1 à 10 utilisateurs sur 100) sont :

- des démangeaisons,
- une sensation de brûlure,
- une douleur au site d'application.

Les effets indésirables peu fréquents (1 à 10 utilisateurs sur 1 000) sont :

- des rougeurs,
- un inconfort,
- un gonflement au site d'application.

Les effets indésirables dont la fréquence n'est pas déterminée sont :

- une allergie (hypersensibilité),
- un gonflement de la gorge ou du visage (angioedème),
- une éruption sur la peau,
- une urticaire,
- des cloques,
- la peau qui pèle (exfoliation).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre

pharmacien.

#### 5. COMMENT CONSERVER PEVARYL 1 POUR CENT, SOLUTION POUR APPLICATION LOCALE EN FLACON PULVÉRISATEUR ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température inférieure à 30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur ?**

**La substance active est:**

Nitrate d'éconazole ..... 1,00 g

Pour 100 g de solution.

**Les autres composants sont:**

Ethanol, propylène glycol, trométamol, parfum.

**Qu'est-ce que PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application locale. Flacon pulvérisateur de 30 g.

#### **Titulaire**

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE  
1, rue Camille Desmoulins  
92130 ISSY LES MOULINEAUX

#### **Exploitant**

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE  
1, rue Camille Desmoulins  
92130 ISSY LES MOULINEAUX

#### **Fabricant**

LUSOMEDICAMENTA  
SOCIEDADE TECHNICA FARMACEUTICA S.A.  
Estrada Consiglieri Pedroso 69 B  
Queluz de Baixo  
2730-055 BARCARENA  
PORTUGAL  
ou  
JANSSEN PHARMACEUTICA NV  
Turnhoutseweg 30  
2340 BEERSE  
BELGIQUE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 23/08/2012.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).