

LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique

Carbomère (carbopol 980)

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique ?
3. COMMENT UTILISER LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE LACRINORM 0,2 POUR CENT, GEL OPHTALMIQUE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

SUBSTITUT LACRYMAL

(S: organe des sens)

Ce gel ophtalmique est indiqué dans le traitement symptomatique de la sécheresse oculaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER LACRINORM 0,2 POUR CENT, GEL OPHTALMIQUE ?

N'utilisez jamais LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique dans le cas suivant:

Allergie à l'un des composants du médicament.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique:

Mises en garde spéciales

Ne pas injecter, ne pas avaler.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre les deux instillations.

Ne pas toucher l'œil avec l'embout du tube.

Reboucher le tube après utilisation.

En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une irritation des yeux.

Éviter le contact avec les lentilles de contact souples. Retirer les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre.

Le chlorure de benzalkonium peut décolorer les lentilles de contact souple.

Précautions d'emploi

En cas de persistance des symptômes, CONSULTER UN MEDECIN, afin qu'il adapte votre traitement.

Évitez le port de lentilles de contact souples pendant la durée du traitement en raison du risque lié à la présence de chlorure de benzalkonium.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, notamment si vous êtes traité par un autre collyre.

Grossesse et allaitement

Compte tenu des données disponibles, l'utilisation chez la femme enceinte ou qui allaite est possible.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Un trouble visuel bref peut se produire après instillation du produit jusqu'à ce que le gel se répartisse uniformément à la surface de l'œil.

Informations importantes concernant certains composants de LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique

Liste des excipients à effet notoire: chlorure de benzalkonium.

3. COMMENT UTILISER LACRINORM 0,2 POUR CENT, GEL OPHTALMIQUE ?

Posologie

En moyenne, 1 goutte, 3 à 4 fois par jour ou plus, si la gravité des symptômes le nécessite.

Mode et voie d'administration

Voie locale

EN INSTILLATION OCULAIRE

- se laver soigneusement les mains avant de procéder à l'application,
- instiller la goutte de gel ophtalmique dans le coin interne de l'œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas,
- ne pas toucher l'œil avec l'embout du tube,
- reboucher le tube après utilisation.

Fréquence d'administration

Répartir les instillations au cours de la journée, en fonction des besoins.

Durée du traitement

Si les troubles persistent ou s'aggravent, consulter un ophtalmologiste afin qu'il adapte votre traitement.

Si vous avez pris plus de LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique que vous n'auriez dû:

En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité de:

- vision trouble,
- sensation de brûlure transitoire passagère après l'instillation jusqu'à ce que le gel se répartisse uniformément à la surface de l'œil,
- sensation de paupières collées,
- réactions d'irritation ou d'hypersensibilité,
- en raison de la présence de chlorure de benzalkonium, risque d'eczéma, d'irritation et de gêne respiratoire.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER LACRINORM 0,2 POUR CENT, GEL OPHTALMIQUE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Une fois entamé, le tube ne doit pas être conservé plus de 30 jours.

Ce médicament doit être conservé à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique ?

La substance active est:

Carbomère (carbopol 980) 0,200 g

Pour 100 g de gel ophtalmique.

Les autres composants sont:

Sorbitol, chlorure de benzalkonium, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Qu'est-ce que LACRINORM 0,2 POUR CENT, gel ophtalmique et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gel ophtalmique.

Tube de 5 g ou de 10 g

Titulaire

LABORATOIRE CHAUVIN
416, RUE SAMUEL MORSE
CS99535
34961 MONTPELLIER CEDEX 2

Exploitant

LABORATOIRE CHAUVIN
416, RUE SAMUEL MORSE
CS99535
34961 MONTPELLIER CEDEX 2

Fabricant

LABORATOIRE CHAUVIN
Z.I. RIPOTIER HAUT
07200 AUBENAS

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 25/02/2014.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).