

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que EUPHRASIA 3 DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser EUPHRASIA 3 DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose ?
3. Comment utiliser EUPHRASIA 3 DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver EUPHRASIA 3 DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE EUPHRASIA 3 DH WELEDA, COLLYRE EN SOLUTION EN RÉCIPIENT UNIDOSE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé en cas d'irritation ou de gêne oculaire avec rougeur ou larmoiement, sensation de brûlure, d'origine allergique ou physique:

Fatigue ou surmenage oculaire: travail sur écran, jeux vidéo, télévision...

Bain en piscine ou en eau de mer

Exposition au vent, pollens, atmosphère polluée, fumée, poussière...

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER EUPHRASIA 3 DH WELEDA, COLLYRE EN SOLUTION EN RÉCIPIENT UNIDOSE ?

N'utilisez jamais EUPHRASIA 3 DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose :

- Chez l'enfant de moins d'un an.
- si vous êtes allergique (hypersensible) à EUPHRASIA ou à l'un des autres composants contenus dans EUPHRASIA 3 DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose.

Faites attention avec EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose:

- A réserver aux affections mineures. Si les symptômes augmentent ou persistent plus de deux jours, consulter un médecin.
- Pour les porteurs de lentilles de contact: instiller le collyre 15 minutes avant la pose des lentilles.

Utilisation d'autres médicaments:

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

En l'absence de données expérimentales et cliniques, et par mesures de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

Les effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés. Toutefois, en cas d'effets indésirables oculaires pouvant gêner la conduite ou l'utilisation de machines, il convient d'attendre que les symptômes régressent avant de conduire ou d'utiliser des machines

3. COMMENT UTILISER EUPHRASIA 3 DH WELEDA, COLLYRE EN SOLUTION EN RÉCIPIENT UNIDOSE ?

Posologie


Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 1 an.

1 goutte dans chaque œil 3 fois par jour.

Se laver soigneusement les mains avant chaque utilisation. Détacher un flacon unidose de la barrette. Ouvrir l'unidose en tournant l'embout. Tirer la paupière inférieure vers le bas en regardant vers le haut et laisser tomber une goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival inférieur (entre la paupière et l'œil). Ne pas toucher les paupières ou les cils ou la surface de l'œil avec l'embout de l'unidose. Clignez plusieurs fois des yeux pour s'assurer d'une bonne diffusion de la solution sur toute la surface de l'œil. Un même flacon peut être utilisé pour les deux yeux.

Mode d'administration

Voie ophtalmique.



Utiliser le flacon immédiatement après ouverture. Jeter le flacon après usage.

Durée du traitement

La durée du traitement ne doit pas dépasser 10 jours.

Si vous oubliez d'utiliser EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose:

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Des réactions d'irritations oculaires tels que sensation de brûlures, œil rouge, démangeaisons, gonflements ou augmentation de la sécrétion lacrymale ont été rapportées. Leur fréquence d'apparition n'est pas connue.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER EUPHRASIA 3 DH WELEDA, COLLYRE EN SOLUTION EN RÉCIPIENT UNIDOSE ?

Tenir ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser EUPHRASIA 3 DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose après la date de péremption mentionnée sur la boîte et le flacon.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas conserver un flacon après ouverture.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient EUPHRASIA 3 DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose ?

La substance active est :

Euphrasia 3DH

Les autres composants sont :

Chlorure de sodium, phosphate monosodique monohydraté, phosphate disodique dihydraté, eau pour préparations injectables

Qu'est-ce que EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose et contenu de l'emballage extérieur ?

L'emballage contient 2 barrettes de 5 flacons unidoses de 0,4 ml d'Euphrasia 3DH WELEDA, collyre en solution.

Titulaire

LABORATOIRE WELEDA
9 RUE EUGENE JUNG
68330 HUNINGUE

Exploitant

LABORATOIRE WELEDA
9 RUE EUGENE JUNG
68330 HUNINGUE

Fabricant

LABORATOIRE WELEDA
9 RUE EUGENE JUNG
68330 HUNINGUE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 10/02/2014.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).