

## GRANIONS DE SOUFRE 19,5 mg/2 ml, solution buvable

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE GRANIONS DE SOUFRE 19,5 mg/2 ml, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GRANIONS DE SOUFRE 19,5 mg/2 ml, solution buvable ?
3. COMMENT PRENDRE GRANIONS DE SOUFRE 19,5 mg/2 ml, solution buvable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER GRANIONS DE SOUFRE 19,5 mg/2 ml, solution buvable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE GRANIONS DE SOUFRE 19,5 MG/2 ML, SOLUTION BUVALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### OLIGOTHERAPIE

(V: divers)

Ce médicament est utilisé comme modificateur du terrain en particulier au cours d'affections récidivantes cutanées, rhumatologiques et de la sphère O.R.L.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GRANIONS DE SOUFRE 19,5 MG/2 ML, SOLUTION BUVALE ?

**Ne prenez jamais GRANIONS DE SOUFRE 19,5 mg/2 ml, solution buvable dans le cas suivant:**

- antécédent d'allergie à l'un des constituants de la solution.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Faites attention avec GRANIONS DE SOUFRE 19,5 mg/2 ml, solution buvable:**

#### Mises en garde spéciales

Le traitement par cet élément minéral trace ne dispense pas d'un traitement spécifique éventuel.

Ce médicament contient du sodium. Le taux de sodium est inférieur à 1 mmol par dose, c'est-à-dire « sans sodium ».

#### Précautions d'emploi

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments:

**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

#### Grossesse et allaitement

Par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

**Liste des excipients à effet notoire:** sodium.

### 3. COMMENT PRENDRE GRANIONS DE SOUFRE 19,5 MG/2 ML, SOLUTION BUVALE ?

#### Posologie

RESERVE A L'ADULTE.

1 à 2 ampoules par jour.

#### Mode et voie d'administration

Voie orale.

Il est conseillé d'absorber le contenu des ampoules dilué dans un verre d'eau, en dehors des repas.

#### Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré

A prendre de préférence en dehors des repas.

**Si vous avez pris plus de GRANIONS DE SOUFRE 19,5 mg/2 ml, solution buvable que vous n'auriez dû:**

Un surdosage éventuel pourra entraîner un effet laxatif.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, GRANIONS DE SOUFRE 19,5 mg/2 ml, solution buvable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien qu'aucun effet indésirable n'ait été rapporté.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER GRANIONS DE SOUFRE 19,5 MG/2 ML, SOLUTION BUVALE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser GRANIONS DE SOUFRE 19,5 mg/2 ml, solution buvable après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient GRANIONS DE SOUFRE 19,5 mg/2 ml, solution buvable ?**

#### La substance active est:

Thiosulfate de sodium ..... 75,56 mg

Quantité exprimée en soufre ..... 19,50 mg

Pour une ampoule de 2 ml.

#### Les autres composants sont:

Amylose, glycérol, gomme xanthane, eau purifiée.

**Qu'est-ce que GRANIONS DE SOUFRE 19,5 mg/2 ml, solution buvable et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable, ampoule de 2 ml - boîte de 10 et 30 ampoules.

#### Titulaire

LABORATOIRE DES GRANIONS  
7, RUE DE L'INDUSTRIE  
LE MERCATOR  
98000 MONACO  
MONACO

#### Exploitant

LABORATOIRES DES GRANIONS  
LE MERCATOR  
7, RUE DE L'INDUSTRIE  
Z.I. DE FONTVIEILLE

98000 MONACO

**Fabricant**

LABORATOIRE DES GRANIONS  
7, RUE DE L'INDUSTRIE  
98000 MONACO

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 22/12/2011.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).