

# CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, collyre en solution

## Cromogliccate de sodium

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, collyre en solution ?
3. COMMENT UTILISER CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, collyre en solution ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, collyre en solution ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, COLLYRE EN SOLUTION ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### ANTI-ALLERGIQUE

(S = organe sensoriel)

Ce collyre est indiqué en cas de maladie de l'œil d'origine allergique (conjonctivite allergique).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, COLLYRE EN SOLUTION ?

#### N'utilisez jamais CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, collyre en solution :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au cromogliccate de sodium ou à l'un des autres composants contenus dans CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, collyre en solution ([voir composition](#)).

#### Faites attention avec CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, collyre en solution :

Ne dépassez pas la posologie recommandée.

En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendez 15 minutes entre chaque instillation.

En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une irritation des yeux.

Éviter le contact avec les lentilles de contact souples. Retirer les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre.

Le chlorure de benzalkonium peut décolorer les lentilles de contact souple.

Lavez-vous soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.

Refermez soigneusement le flacon après utilisation.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

En cas de traitement par un autre collyre, attendez 15 minutes entre chaque instillation.

#### Grossesse/Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Une gêne visuelle passagère peut être ressentie après instillation du collyre.

#### Informations importantes concernant certains composants de CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, collyre en solution :

Ce médicament contient du chlorure de benzalkonium.

### 3. COMMENT UTILISER CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, COLLYRE EN SOLUTION ?

#### Posologie

Adulte et enfant: selon la sévérité des symptômes, instillez 1 goutte dans chaque œil, 2 à 6 fois par jour, à intervalles réguliers.

Chez l'enfant un avis médical est nécessaire.

Ne dépassez pas la posologie recommandée.

**DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.**

#### Mode d'administration

Voie ophtalmique.

EN INSTILLATION OCULAIRE.

Lavez-vous soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.

Instillez 1 goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival de l'œil malade en regardant vers le haut, et en tirant légèrement la paupière vers le bas et en évitant le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières.

Rebouchez le flacon après utilisation.

#### Fréquence d'administration

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendez 15 minutes entre chaque instillation.

#### Durée de traitement

Ne prolongez pas le traitement sans avis médical.

En l'absence d'amélioration comme en cas de persistance des symptômes, prenez un avis médical.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, collyre en solution est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Possibilité de survenue de réaction allergique aux composants du produit.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, COLLYRE EN SOLUTION ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le flacon. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Après ouverture, le collyre se conserve au maximum 28 jours.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### Que contient CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, collyre en solution ?

##### La substance active est:

Cromogliccate de sodium ..... 2 g

Pour 100 ml de collyre en solution.

##### Les autres composants sont:

Chlorure de benzalkonium, édétate disodique, eau purifiée.

**Qu'est-ce que CROMOGLICATE DE SODIUM BIOGARAN 2 %, collyre en solution et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de collyre en solution.

Flacon de 5 ml.

**Titulaire**

LABORATOIRES BIOGARAN  
15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE  
92707 COLOMBES CEDEX

**Exploitant**

LABORATOIRES BIOGARAN  
15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE  
92707 COLOMBES CEDEX

**Fabricant**

LAPHAL INDUSTRIES  
AVENUE DE PROVENCE  
13190 ALLAUCH

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 27/08/2012.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).