

GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?
3. COMMENT UTILISER GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE GYNOPURA L.P. 150 MG, OVULE À LIBÉRATION PROLONGÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du nitrate d'éconazole: un antifongique et antibactérien.

Il est indiqué dans le traitement local des mycoses (affections dues à des champignons microscopiques) de la vulve et du vagin parfois surinfectées.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER GYNOPURA L.P. 150 MG, OVULE À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

N'utilisez jamais GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée dans les cas suivants:

- allergie à l'un des composants du produit ([voir que contient GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?](#)) ou à une substance apparentée (appartenant au groupe des imidazolés),
- utilisation avec un diaphragme en latex.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Faites attention avec GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée:

Le traitement local de la mycose n'est qu'un élément du traitement d'ensemble. Pour éviter les rechutes, la recherche de facteurs favorisants par votre médecin est indispensable.

Ne pas utiliser un savon acide pour l'hygiène locale, l'acidité favorisant la prolifération des champignons ([voir Mode d'administration](#)).

Ce traitement peut entraîner des sensations de brûlures locales et une augmentation des démangeaisons. Généralement, ces phénomènes cèdent spontanément à la poursuite du traitement. Si les symptômes persistent au delà de 24 à 48 heures, interrompez le traitement et consultez votre médecin.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ne pas utiliser avec des produits spermicides (risque d'inactivation) ni avec un diaphragme en latex (risque de rupture du diaphragme).

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER GYNOPURA L.P. 150 MG, OVULE À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

Posologie

Dans la majorité des cas, 1 ovule de préférence le soir au coucher, en administration unique.

Dans certains cas, votre médecin peut vous prescrire un ovule le soir et un ovule le lendemain matin.

Dans tous les cas, se conformer aux recommandations de votre médecin ou de votre pharmacien.

Si vous avez l'impression que l'effet de GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

Voie vaginale.

Introduire profondément l'ovule dans le vagin, de préférence en position allongée. La façon la plus facile de procéder est de vous allonger sur le dos, les genoux repliés et écartés.

Conseils pratiques:

- toilette avec un savon pH neutre ou alcalin,
- afin de ne pas contaminer votre entourage, utiliser votre propre linge de toilette (gant, serviette),
- votre médecin pourra:
 - traiter également votre partenaire sexuel, afin d'éviter qu'il ne vous recontamine,
 - vous prescrire un antifongique à appliquer localement,
- porter des sous-vêtements en coton,
- éviter les douches vaginales,
- ne pas interrompre le traitement pendant les règles,
- éviter de porter des tampons internes pendant le traitement.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- réactions au site d'application tels que sensations de brûlures, irritations, démangeaisons et érythème (rougeur de la peau),
- dermatites de contact (inflammation de la peau) et urticaire.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER GYNOPURA L.P. 150 MG, OVULE À LIBÉRATION PROLONGÉE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à une température ne dépassant pas +30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?

La substance active est:

Nitrate d'éconazole 150 mg

Pour un ovule à libération prolongée.

Les autres composants sont:

Galactomannane, silice colloïdale anhydre, glycérides hémisynthétiques solides, heptanoate de stéaryle.

Qu'est-ce que GYNOPURA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme d'ovule à libération prolongée. Boîte de 1 ou 2 ovule(s).

Titulaire

laboratoires besins international

3 rue du bourg l'abbe
75003 paris

Exploitant

LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL
13 RUE PERIER
92100 MONTRouGE

Fabricant

UNITHER INDUSTRIES
Z.I. LE MALCOURLET
03800 GANNAT
ou
LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL
13 RUE PERIER
92100 MONTRouGE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 20/11/2013.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).