

SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale

Triclocarban

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 8 à 10 jours de traitement, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

- QU'EST-CE QUE SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale ?
- COMMENT UTILISER SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale ?
- QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
- COMMENT CONSERVER SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale ?
- INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE SOLUBACTER 1 POUR CENT, SOLUTION POUR APPLICATION LOCALE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est une solution pour application locale à visée antiseptique,

Il est préconisé:

- dans le nettoyage de la peau et des muqueuses,
- dans le traitement d'appoint d'une éventuelle surinfection de la peau et des muqueuses.
- Traitement local d'appoint des infections vaginales à germes sensibles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SOLUBACTER 1 POUR CENT, SOLUTION POUR APPLICATION LOCALE ?

Ne prenez jamais SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale dans les cas suivants:

- antiseptie avant prélèvement (ponction, injection),
- désinfection du matériel médico-chirurgical,
- en cas d'allergie connue à l'un des constituants de la solution.

Faites attention avec SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale :

Mise en garde spéciales

Ne pas utiliser chez le nouveau-né.

Précautions d'emploi

Dès l'ouverture du flacon, une contamination microbienne est possible. Veiller à ne pas garder trop longtemps un flacon d'antiseptique entamé.

- La chaleur dégrade la solution de SOLUBACTER

En conséquence:

- Diluer dans l'eau froide.
- Conserver à l'abri de la chaleur.
- Ne pas imprégner des tissus qui seraient ensuite lavés à l'eau très chaude, ou repassés.
- **Toujours rincer après emploi.**
- Eviter l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques différents avec cet antiseptique.
- Les antiseptiques gynécologiques peuvent inactiver les spermicides locaux et entraver leur activité contraceptive.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER SOLUBACTER 1 POUR CENT, SOLUTION POUR APPLICATION LOCALE ?

La solution doit être préparée avec de l'eau potable, froide, juste avant l'utilisation.

Ne pas conserver une solution diluée.

Rincer abondamment après emploi.

- Dans le cas du nettoyage et de l'antiseptie des petites plaies:
 - le produit peut être utilisé pur mais l'application doit être suivie d'un rincage abondant.
- En cas d'utilisation répétée, utiliser la solution diluée:

Chez l'adulte:

Le SOLUBACTER s'utilise dilué à la dose de 30 ml dans 250 ml d'eau.

Rincer abondamment en fin de lavage.

Chez l'enfant et le nourrisson:

- pour le bain: une cuillère à soupe (15 ml) pour une baignoire d'enfant (environ 10 litres).
Rincer abondamment après le bain.
- pour l'antiseptie locale: préparer une solution de solubacter diluée: une cuillère à café (5 ml) dans 1 litre d'eau puis en imprégner une compresse.
Rincer après traitement.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- réactions allergiques locales possibles.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER SOLUBACTER 1 POUR CENT, SOLUTION POUR APPLICATION LOCALE ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale ?

La substance active est:

Triclocarban 1,00 g

Les autres composants sont:

Solution aqueuse de NN dihydroxyéthyl N alkyl amino acétate de 36 à 40 pour 100 (m/m) de matière active (AMONYL 640 NLND), solution aqueuse de N oxyde d'alkyl diméthylamine de 30 à 32 pour cent (m/m) de matière active (Aromox DMMCD - WND), solution aqueuse d'alkyl amido propyldiméthylamino polypeptide de 24 à 28 pour cent (m/m) de matière active (Montéine LCQND), édétate de sodium, parfum chemodermND, bleu patenté (E 131), acide lactique, eau purifiée.

NDComposition du parfum chemoderm: alcool phényléthylrique, linalol, citronellol, aldéhyde alpha hexyl cinnamique, hydroxycitronellal, esters d'acide acétique, esters d'acide butyrique, esters d'acide phénylacétique, alcool éthylique, alcool méthylique, alcool phényléthylrique, phtalate d'éthyle.

Qu'est-ce que SOLUBACTER 1 POUR CENT, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application locale. Boîte de 1 flacon de 150, 250, 400, 1000 ou 5000 ml.

Titulaire

LABORATOIRE DU SOLUBACTER
17 RUE DE NEUILLY
IMPASSE PASSOIR
92110 CLICHY

Exploitant

DB PHARMA
1 BIS RUE DU COMMANDANT RIVIERE
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

Fabricant

FARMACLAIR
440 avenue du Général de Gaulle
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 10/11/2015.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).