

ALGESAL SURACTIVE, crème

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est à dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Si les symptômes persistent, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
- Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALGESAL SURACTIVE, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ALGESAL SURACTIVE, crème ?
3. COMMENT UTILISER ALGESAL SURACTIVE, crème ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALGESAL SURACTIVE, crème ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALGESAL SURACTIVE, CRÈME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

A visée antalgique.

(M. SYSTEME LOCOMOTEUR).

Traitement local d'appoint des douleurs d'origine musculaire et tendino-ligamentaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ALGESAL SURACTIVE, CRÈME ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants:

- Allergie aux salicylés, à un médicament apparenté (AINS, aspirine) ou à un autre des composants.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses, les yeux, sur une plaie, une lésion suintante, une lésion infectée ni sous pansement occlusif.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde spéciales

Respectez les conseils d'utilisation:

- ne pas utiliser sur les muqueuses, les yeux, une dermatose suintante, un eczéma, une lésion infectée ou une plaie, ni sous pansement occlusif
- ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée ([voir rubrique POSOLOGIE](#)),
- ne pas appliquer sur une surface étendue du corps,
- ne pas appliquer en cas d'allaitement,
- respecter la fréquence et la durée de traitement préconisées.

Après usage, il est nécessaire de se laver les mains pour éviter tout contact involontaire du produit avec les yeux et les muqueuses.

Précautions d'emploi

Ce médicament contient de l'huile de ricin et peut provoquer des réactions allergiques sévères.

Ce médicament contient de l'alcool cétylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple: eczéma).

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques qui peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament et en aucun cas il ne devra être appliqué sur les seins.

L'attention des sportifs est attirée par le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

Liste des excipients à effet notoire: huile de ricin, alcool cétylique.

3. COMMENT UTILISER ALGESAL SURACTIVE, CRÈME ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 7 ANS.

En massages locaux sur la zone douloureuse, 2 à 3 fois par jour, jusqu'à pénétration complète.

Se laver les mains après utilisation.

Mode et voie d'administration

Voie cutanée.

Durée du traitement

Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

Eventuelle réaction allergique locale nécessitant l'arrêt du traitement.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

5. COMMENT CONSERVER ALGESAL SURACTIVE, CRÈME ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

A conserver à une température inférieure ou égale à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient ALGESAL SURACTIVE, crème ?

Les substances actives sont:

Acide salicylique	6,54 g
Diéthylamine	3,46 g
Myrtécaine	1,00 g

Pour 100 g de crème.

Les autres composants sont:

Excipients: Monostéarate d'éthylèneglycol, Paraffine liquide légère. Alcool cétylique, Huile de ricin polyoxyéthylénée, Stéarate de macrogol 300, Glycérides polyglycosés saturés, Monostéarate de glycérol, Composition lavandin*, Acide chlorhydrique, Eau purifiée.

***Composition de la composition lavandin:** Huile essentielle de lavandin grosso, huile essentielle et fractions d'huile essentielle d'eucalyptus de Chine, linalol, acétate de linalyle, camphre racémique.

Crème - Tubes de 40, 50 et 100 g.

Titulaire

PHARMA DEVELOPPEMENT
CHEMIN DE MARCY
ZONE INDUSTRIELLE

58800 CORBIGNY

Exploitant

PHARMA DEVELOPPEMENT
CHEMIN DE MARCY
ZONE INDUSTRIELLE
58800 CORBIGNY

Fabricant

PHARMA DEVELOPPEMENT
CHEMIN DE MARCY
ZONE INDUSTRIELLE
58800 CORBIGNY

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 18/02/2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).