

Biotine Bayer 0,5 pour cent

Solution injectable I.M.

Vitamine H



Composition qualitative et quantitative

BIOTINE (vitamine H) 5 mg

Excipients : dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, bicarbonate de sodium, parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), eau pour préparations injectables.

Pour une ampoule de 1 ml

Forme pharmaceutique

Solution injectable en ampoule de 1 ml, boîte de 6

Classe pharmaco-thérapeutique

VITAMINE H

(D : Dermatologie)

Nom et adresse de l'exploitant

Bayer Santé Familiale
33, rue de l'industrie - 74240 Gaillard

Nom et adresse du fabricant

Cenexi - 52, rue Marcel et Jacques Gaucher - 94120 Fontenay-sous-Bois

Dans quels cas utiliser ce médicament

Ce médicament contient de la vitamine H.

Il est indiqué dans le traitement d'appoint des chutes de cheveux diffuses de l'adulte.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie connue à l'un des composants, notamment aux parabens.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi :

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse ni

pendant l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients :

Parahydroxybenzoate de méthyle (E 218)

Parahydroxybenzoate de propyle (E 216).

Comment utiliser ce médicament

Posologie :

Réservé à l'adulte.

1 ou 2 ampoules, 3 fois par semaine en injections intra-musculaires.

Mode et voie d'administration :

Solution injectable par voie intra-musculaire.

Durée du traitement :

Se conformer à la prescription médicale.

Effets non souhaités et gênants

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants.

En raison de la présence de parahydroxybenzoate, risque d'eczéma de contact, et exceptionnellement risque de réactions allergiques avec urticaire et gêne respiratoire.

Ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien et à signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Conservation

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Précautions particulières de conservation :

A conserver à une température inférieure à 25°C.

Date de révision de la notice :

Juin 2005.

Ne jamais laisser un médicament à la portée des enfants.



Bayer Santé Familiale participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments vendus en France Métropolitaine. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

Bayer Santé Familiale

33, rue de l'Industrie - 74240 Gaillard

Tél : 04.50.87.70.70

28021964